

ISSN 1514-2841

NUEVA LISTA DE LAS AVES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

AUTORES

C.A. DARRIEU &
A.R. CAMPERI



COBIOBO N° 3

Comisión de Biodiversidad
Bonaerense

PROBIOTA N° 2

Programa para el Estudio
y Uso Sustentable de la
Biota Austral

Convenio

SECRETARIA DE POLÍTICA AMBIENTAL-UNLP



AUTORIDADES

Gobernador de la Provincia de Buenos Aires
Dr. Carlos Federico Ruckauf

Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires
Ing. Felipe Solá

Secretario de Política Ambiental
Dr. Ricardo Eusebio Rodríguez

Subsecretaria de Organizaciones No Gubernamentales y
Relaciones Institucionales
Dra. Maria Elena Torresi de Mércuri

Subsecretario Técnico y Operativo
Dr. Mario Guerchicoff

Director Provincial de Evaluación y Recursos Naturales
Arq. Néstor Gil Conners

RESPONSABLES DE LA COBIOBO

Secretaría de Política Ambiental
Lic. Susana Mulvany

Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP
Dr. Jorge V. Crisci
Dr. Hugo López
Dr. Juan Schnack

NUEVA LISTA SISTEMÁTICA DE LAS AVES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

C.A. Darrieu y A.R. Camperi

Sección Ornitología, División Zoología Vertebrados, Museo de La Plata.

Las políticas de desarrollo en vigencia promueven cambios en los ambientes naturales, de los que resultan transformaciones drásticas en el paisaje natural, afectando la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas. Una de las consecuencias más serias de este proceso es la pérdida o modificación del hábitat de las especies nativas, tanto vegetales como animales, determinando una disminución biótica por extinciones locales de especies y comunidades (Solbrig, 1991; Sarandón, 1992; Sarandón y Sarandón, 1993). Este problema, reconocido como uno de los más críticos a escala global (Solbrig *et al.*, 1992), tiene una importancia relevante en el contexto regional de América Latina (Sarandón y Sarandón, 1993; Olson & Dinerstein, 1994), siendo de esperar que el mismo se intensifique en ciertos sectores del área pampeana argentina.

La avifauna es uno de los componentes de la diversidad biológica más conspicuo e importante de los ecosistemas terrestres (pastizales, bosques), acuáticos continentales (lagunas, ríos) y marinos costeros. Al mismo tiempo es un grupo heterogéneo en relación a las características biológicas de las especies y a su sensibilidad o respuesta frente a las distintas acciones humanas.

Ciertos factores afectan la conservación de numerosas especies de aves de la provincia. Uno de los problemas más graves es el originado por la destrucción de los ambientes naturales. Por ejemplo el pastizal pampeano ha sufrido profundas modificaciones, debido a la actividad agropecuaria. A partir de fines del siglo XIX comenzó una gran transformación de los mismos, ocasionada fundamentalmente por la cría extensiva de ganado. La vegetación original del pastizal fue sustituida parcialmente por pastos cortos debido a la acción conjunta del fuego, del pastoreo y del arado; esto produjo modificaciones en la presencia y el número de aves ligadas a ese hábitat.

El territorio bonaerense cuenta con numerosos cuerpos de agua, con alta bioproductividad y una avifauna acuática muy rica y variada. Entre las familias mejor representadas se encuentran Anatidae (patos, cisnes), Rallidae (gallaretas, gallinetas, burritos), Podicipedidae (macaes) y Ardeidae (garzas). Estos ambientes están afectados fundamentalmente por la contaminación proveniente de desagües industriales o cloacales, y por el uso de pesticidas en áreas perimetrales a estos cuerpos de agua. La aplicación de plaguicidas incide negativamente en el ciclo reproductivo de varias especies. Las presas contaminadas con plaguicidas que ingieren las aves, incorporan tóxicos que se van acumulando en el organismo de éstas, produciendo efectos nocivos (infertilidad, debilitamiento de la cáscara del huevo, inviabilidad del embrión) o, en casos extremos, la muerte. Un ejemplo del impacto producido por los plaguicidas es el del Aguilucho Langostero (*Buteo swainsoni*), que ha sido objeto de numerosos artículos en revistas internacionales. Esta especie de Accipitridae llega a nuestro país como migrador desde América del Norte. Por medio del anillado y otros métodos de seguimiento, se detectó una

alarmante disminución en las poblaciones. La mortandad masiva de individuos se produjo en una zona aledaña a Hilario Lagos (provincia de La Pampa, Argentina), debido al consumo de tucuras contaminadas con plaguicidas. Se determinó que el total de individuos muertos superaba los 5000 (aunque se infirió que esta cifra representaría la cuarta parte del número real de decesos). La Pampa, el noroeste de Buenos Aires y centro-sur de Córdoba resultaron ser las áreas más críticas.

Otro factor que afecta a las poblaciones es el de la caza comercial y deportiva. La primera, dedicada a la captura de aves destinadas al mascotismo, impacta especialmente a varias especies de Passeriformes (cardenales, corbatitas, mistos, jilgueros, etc.). En cuanto a la caza deportiva, ejerce una presión selectiva sobre un número limitado de especies de importancia cinegética. Entre los grupos más perseguidos se encuentran los integrantes de la familia Tinamidae (“perdices” o inambúes, martinetas, etc.), algunas de cuyas especies, como la Colorada (*Rhynchotus rufescens*), son escasas y están protegidas. También deben mencionarse a los patos silvestres (Anatidae), que son cazados en menor medida, y al Ñandú (*Rhea americana*), especie perseguida para extraer sus plumas y su carne a lo que se le suma la progresiva destrucción de su hábitat lo cual ha producido su extinción en la provincia de Buenos Aires, quedando pequeños grupos en semicautiverio dentro de las estancias.

En la provincia de Buenos Aires existen especies autóctonas que por su numerosidad, potencial biótico y hábitos alimentarios son consideradas plaga o dañinas para la agricultura. Las de mayor importancia son el Cauquén Común (*Chloephaga picta*), la Torcaza (*Zenaida auriculata*), el Loro Barranquero (*Cyanoliseus patagonus*) y la Cotorra (*Myiopsitta monachus*). Estas aves son combatidas empleando diversos métodos. En el caso de la Cotorra se utilizó la pulverización y el uso de biocidas, que afectaron por igual a muchas otras especies no perjudiciales.

Un factor negativo que debe afrontar la avifauna bonaerense es la competencia con especies introducidas por el hombre, las cuales en su mayoría poseen gran plasticidad adaptativa y alto potencial biótico. Como ejemplos más representativos pueden mencionarse a la Paloma Doméstica (*Columba livia*) y al Gorrión (*Passer domesticus*). Entre las especies más recientemente introducidas podemos citar al Verderón Común (*Carduelis chloris*), al Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*) y al Estornino Crestado (*Acridotheres cristatellus*).

El presente trabajo aporta información de base para el seguimiento y evaluación de la biodiversidad de las aves a escala local o regional.

Para la realización de la lista, hemos tenido como punto de referencia la *Lista sistemática de las aves de la provincia de Buenos Aires* de N. Bó y C. Darrieu 1991 y *Las aves de la provincia de Buenos Aires: distribución y estatus* de T. Narosky y A. Di Giácomo 1993.

La presente enumeración considera todas las especies de aves que habitan la provincia de Buenos Aires, es decir aquellas que nidifican o que pasan gran parte del año en la misma. Se excluyen, por lo tanto, aquellas especies accidentales y ocasionales.

Los datos se basan en citas bibliográficas recientes, material de colección y observaciones de campo realizadas por los autores.

Para indicar la distribución geográfica de las aves se ha seguido el esquema propuesto por Ringuelet y Arámburu (1957, *Enumeración sistemática de los Vertebrados de la Provincia de Buenos Aires*). Según el mismo se divide a la provincia en cuatro áreas: la 1 posee una avifauna de tipo subtropical; en la 2 se encuentran aves pampeanas con

ingresión de especies de la Provincia Chaqueña (Distrito Occidental); en la 4 la avifauna presenta un gran número de especies que llegan por el sur desde la Provincia del Monte (Distrito Meridional) y de la Provincia Patagónica (Distrito Occidental); el área 3 es de transición con aporte de especies de las otras zonas.

La presente lista comprende los nombres científicos tomados de Altman & Swift (1989), *Checklist of the Birds of South America*. Para los nombres vulgares se siguió a Navas *et al* (1991). *Lista Patrón de Nombres Comunes de las Aves Argentinas*. Se incluye además una lista de las especies exóticas naturalizadas.

La categorización de las especies según su riesgo de extinción fue tomada de García Fernandez *et al.* (1997), *Libro Rojo de Mamíferos y Aves Amenazados de la Argentina*. Las categorías son las siguientes: **En Peligro (EP)**, **Vulnerables (VU)**, **Riesgo Bajo potencialmente vulnerable (RB pv)**, **Riesgo Bajo preocupación menor (RB pm)** y **Datos Insuficientes (DI)**.

La avifauna de la provincia de Buenos Aires comprende 19 órdenes, 49 familias y 356 especies. Se incluyen, además, seis especies exóticas introducidas en la provincia que se han adaptado exitosamente.

Orden RHEIFORMES

Familia RHEIDAE

Rhea americana (Linné 1758) **RB pv**

Ñandú

Distribución: Toda la provincia, en semicautividad.

Pterocnemia pennata d'Orbigny 1834 **RB pv**

Choique

Distribución: Area 4.

Orden TINAMIFORMES

Familia TINAMIDAE

Rhynchotus rufescens (Temminck 1815) **RB pm**

Colorada

Distribución: Toda la provincia

Nothoprocta cinerascens (Burmeister 1860) **RB pm**

Inambú Montaraz

Distribución: Area 4. Escasos registros en 2.

Nothura darwinii Gray 1867 **RB pm**

Inambú Pálido

Distribución: Area 4. Escasos registros en 2 y 3.

Nothura maculosa (Temminck 1815) **RB pm**

Inambú Común

Distribución: Toda la provincia.

Eudromia elegans d'Orbigny y Geoffroy 1832 **RB pm**

Martineta Común

Distribución: Areas 2, 3 y 4. Escasos registros en 1.

Orden PODICIPEDIFORMES

Familia PODICIPEDIDAE

Podilymbus podiceps (Lesson 1842) **RB pm**

Macá Pico Grueso

Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4.

Podiceps rolland Quoy y Gaimard 1824 **RB pm**

Macá Común

Distribución: Toda la provincia.

Podiceps occipitalis Garnot 1826 **RB pm**

Macá Plateado

Distribución: Toda la provincia.

Observaciones: Migratorio.

Podiceps major (Boddaert 1783) **RB pm**

Macá Grande

Distribución: Toda la provincia.

Orden PELECANIFORMES

Familia PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax olivaceus (Humbolt 1805) **RB pm**

Biguá

Distribución: Toda la provincia.

Familia ANHINGIDAE

Anhinga anhinga (Linné 1766) **RB pm**

Aninga

Distribución: Area 1.

Orden CICONIIFORMES

Familia ARDEIDAE

Botaurus pinnatus (Wagler 1829) **RB pm**

Mirasol Grande

Distribución: Area 1. Escasos registros en 3.

Ixobrychus involucris (Vieillot 1823) **RB pm**

Mirasol Común

Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4.

Tigrisoma lineatum (Boddaert 1783) **RB pm**

Hocó Colorado

Distribución: Area 1.

Syrigma sibilatrix (Temminck 1824) **RB pm**

Chiflón

Distribución: Areas 1, 2, 3 y escasos registros en 4.

Ardea cocoi Linné 1766 **RB pm**

Garza Mora

Distribución: Area 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4.

Casmerodius albus (Linné 1758) **RB pm**

Garza Blanca

Distribución: Toda la provincia.

Egretta thula (Molina 1782) **RB pm**

Garcita Blanca

Distribución: Toda la provincia.

Bubulcus ibis (Linné 1758) **RB pm**

Garcita Bueyera

Distribución: Areas 1, 2, 3 y norte de la 4.

Butorides striatus Linné 1758 **RB pm**

Garcita Azulada

Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4.

Nycticorax nycticorax Linné 1772 **RB pm**

Garza Bruja

Distribución: Areas 1, 2 y 3. Escasos registros en 4.

Familia THRESKIORNITHIDAE

Phimosus infuscatus Lichtenstein 1823 **RB pm**

Cuervillo Cara Pelada

Distribución: Area 1. Escasos registros en 3.

Plegadis chihi (Vieillot 1817) **RB pm**

Cuervillo de Cañada

Distribución: Areas 1, 2 , 3 y norte de la 4.

Harpiprion caerulescens (Vieillot 1817) **RB pm**

Bandurria Mora

Distribución: Escasos registros en áreas 1 y 3.

Theristicus melanopis (Gmelin 1789) **RB pm**

Bandurria Austral

Distribución: Toda la provincia.

Observaciones: Migratoria.

Ajaia ajaja Linné 1758 **RB pm**

Espátula Rosada

Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y el norte de 4.

Familia CICONIIDAE

Mycteria americana Linné 1758 **RB pm**

Tuyuyú

Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2.

Euxenura maguari Gmelin 1789 **RB pm**

Cigüeña Americana

Distribución: Areas 1, 2, 3 y escasos registros en el norte de 4.

Familia PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopus chilensis Molina 1782 **RB pm**

Flamenco Austral

Distribución: Toda la provincia.

Orden ANSERIFORMES

Familia ANHIMIDAE

Chauna torquata Oken 1816 **RB pm**

Chajá

Distribución: Areas 1, 2 y 3. Escasos registros norte de 4.

Familia ANATIDAE

Dendrocygna bicolor (Vieillot 1816) **RB pm**

Sirirí Colorado

Distribución: Areas 1, 2 y 3.

Dendrocygna viduata (Linné 1766) **RB pm**

Sirirí Pampa

Distribución: Areas 1, 2 y 3.

Coscoroba coscoroba Molina 1782 **RB pm**

Coscoroba

Distribución: Toda la provincia.

Cygnus melancoryphus (Molina 1782) **RB pm**

Cisne Cuello Negro

Distribución: Toda la provincia.

Chloephaga poliocephala Sclater 1857 **RB pm**

Cauquén Real

Distribución: Escasos registros en áreas 2, 3 y norte de 4.

Observaciones: Migratoria.

Chloephaga rubidiceps Sclater 1861 **EP**

Cauquén Colorado

Distribución: Escasos registros en sur de área 3 y norte de 4.

Observaciones: Migratoria.

Chloephaga picta (Gmelin 1789) **RB pm**

Cauquén Común

Distribución: Areas 4, sur de 2 y 3.

Observaciones: Migratoria.

Anas flavirostris (Vieillot 1816) **RB pm**

Pato Barcino

Distribución: Toda la provincia.

Anas sibilatrix (Poeppig 1829) **RB pm**

Pato Overo

Distribución: Toda la provincia.

Anas bahamensis Linné 1758 **RB pm**

Pato Gargantilla

Distribución: Toda la provincia.

Anas georgica Gmeling 1789 **RB pm**

Pato Maicero

Distribución: Toda la provincia.

Anas versicolor Vieillot 1816 **RB pm**

Pato Capuchino

Distribución: Areas 1, 2 y 3. Escasos registros en 4.

Anas cyanoptera (Vieillot 1816) **RB pm**

Pato Colorado

Distribución: Toda la provincia.

Anas platalea Vieillot 1816 **RB pm**

Pato Cuchara

Distribución: Toda la provincia.

Anas leucophrys (Vieillot 1816) **RB pm**

Pato de Collar

Distribución: Area 1.

Netta peposaca (Vieillot 1816) **RB pm**

Pato Picazo

Distribución: Areas 1, 2 y 3. Escasos registros en 4.

Amazonetta brasiliensis (Gmelin 1789) **RB pm**

Pato Cutirí

Distribución: Area 1.

Oxyura vittata (Philippi 1870) **RB pm**

Pato Zambullidor Chico

Distribución: Areas 1, 2 y 3. Escasos registros en 4.

Oxyura dominica Linné 1766 **RB pm**

Pato Fierro

Distribución: Area 1.

Heteronetta atricapilla (Merrem 1841) **RB pm**

Pato Cabeza Negra

Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4.

Orden FALCONIFORMES

Familia CATHARTIDAE

Coragyps atratus (Bechstein 1793) **RB pm**
Jote Cabeza Negra
Distribución: Escasos registros en toda la provincia.

Cathartes aura Linné 1758 **RB pm**
Jote Cabeza Colorada
Distribución: Escasos registros en toda la provincia.

Familia ACCIPITRIDAE

Pandion haliaetus (Linné 1758) **RB pm**
Aguila Pescadora
Distribución: Escasos registros en area 1 y 3.
Observaciones: Migratorio.

Elanus leucurus Vieillot 1818 **RB pm**
Milano Blanco
Distribución: Toda la provincia.

Rostrhamus sociabilis (Vieillot 1817) **RB pm**
Caracolero
Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2.

Circus cinereus Vieillot 1816 **RB pm**
Gavilán Ceniciento
Distribución: Areas 1, 3, 4 y sur de la 2.

Circus buffoni Gmelin 1788 **RB pm**
Gavilán Planeador
Distribución: Toda la provincia.

Accipiter striatus Vieillot 1807 **RB pm**
Esparvero Común
Distribución: Escasos registros en área 1.

Geranospiza caerulescens (Vieillot 1817) **RB pm**
Gavilán Patas Largas
Distribución: Escasos registro en área 1.

Buteogallus urubitinga (Gmelin 1788) **RB pm**
Aguila Negra
Distribución: Escasos registros en área 1.

Heterospizias meridionalis (Latham 1790) **RB pm**
Aguilucho Colorado
Distribución: Escasos registros en área 1.

Parabuteo unicinctus (Temmick 1824) **RB pm**

Gavilán Mixto

Distribución: Area 1. Escasos registros en 3 y 4.

Geranoaetus melanoleucus (Vieillot 1819) **RB pm**

Aguila Mora

Distribución: Toda la provincia.

Harpyhaliaetus solitarius (Vieillot 1817) **VU**

Aguila Coronada

Distribución: Escasos registros en el norte del área 4.

Buteo magnirostris (Gmelin 1788) **RB pm**

Taguató Común

Distribución: En toda la provincia, excepto en el extremo sur.

Buteo swainsoni Bonaparte 1838 **RB pm**

Aguilucho Langostero

Distribución: Areas 1, 2, 3 y norte de la 4.

Observaciones: Migratorio.

Buteo albicaudatus Vieillot 1816 **RB pm**

Aguilucho Alas Largas

Distribución: Area 1. Escasos registros en 2, 3 y 4.

Buteo polyosoma (Quoy y Gaimard 1824) **RB pm**

Aguilucho Común

Distribución: Area 4. Escasos registros en 2, 3 y 4.

Familia FALCONIDAE

Polyborus plancus (Miller 1777) **RB pm**

Carancho

Distribución: Toda la provincia.

Milvago chimango (Vieillot 1816) **RB pm**

Chimango

Distribución: Toda la provincia.

Spizapteryx circumcinctus (Kaup 1852) **RB pm**

Halconcito Gris

Distribución: Area 4. Escasos registros en 1 y 2.

Falco sparverius Linné 1758 **RB pm**

Halconcito Colorado
Distribución: Toda la provincia.

Falco femoralis Temminck 1822 **RB pm**
Halcón Plomizo
Distribución: Toda la provincia.

Falco peregrinus Tunstall 1771 **RB pm**
Halcón Peregrino
Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4.

Orden GALLIFORMES

Familia CRACIDAE

Penelope obscura Temminck 1815 **DI**
Pava de Monte Común
Distribución: Escasos registros en el norte de área 1.

Orden GRUIFORMES

Familia RALLIDAE

Coturnicops notata (Gould 1841) **DI**
Burrito Enano
Distribución: Escasos registros en áreas 1 y 3.

Laterallus leucopyrrhus (Vieillot 1819) **RB pm**
Burrito Colorado
Distribución: Area 1.

Laterallus melanophaius (Vieillot 1819) **RB pm**
Burrito Común
Distribución: Norte de área 1.

Laterallus spilopterus (Dunford 1877) **VU**
Burrito Negruzco
Distribución: Escasos registros en áreas 1, 2 y 3.

Aramides cajanea (P. L. S. Müller 1776) **RB pm**
Chiricote
Distribución: Area 1.

Aramides ypecaha (Vieillot 1819) **RB pm**

Ipacaá

Distribución: Area 1.

Poliolimnas flaviventer (Boddaert 1783) **RB pm**

Burrito Amarillo

Distribución: Escasos registros en áreas 1 y 3.

Pardirallus maculatus (Boddaert 1783) **RB pm**

Gallineta Overa

Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2.

Pardirallus sanguinolentus Swainson 1837 **RB pm**

Gallineta Común

Distribución: Toda la provincia.

Gallinula melanops (Vieillot 1819) **RB pm**

Pollona Pintada

Distribución: Area 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4.

Gallinula chloropus Linné 1758 **RB pm**

Pollona Negra

Distribución: Area 1 y 3.

Fulica armillata Vieillot 1817 **RB pm**

Gallareta Ligas Rojas

Distribución: Toda la provincia.

Fulica leucoptera Vieillot 1817 **RB pm**

Gallareta Chica

Distribución: Toda la provincia.

Fulica rufifrons Philippi y Lamdbeck 1861 **RB pm**

Gallareta Escudete Rojo

Distribución: Areas 1, 2 y 3. Escasos registros en 4.

Familia ARAMIDAE

Aramus guarauna (Linné 1766) **RB pm**

Carau

Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4.

Orden CHARADRIIFORMES

Familia CHARADRIIDAE

Vanellus chilensis Molina 1782 **RB pm**

Tero Común

Distribución: Toda la provincia.

Pluvialis squatarola (Linné 1758) **RB pm**

Chorlo Artico

Distribución: Costa atlántica en área 3.

Observaciones: Migratorio.

Pluvialis dominica (P.L.S. Müller 1776) **RB pm**

Chorlo Pampa

Distribución: Areas 1, 2 y 3. Escasos registros en 4.

Observaciones: Migratorio.

Charadrius collaris Vieillot 1818 **RB pm**

Chorlito de Collar

Distribución: Areas 1, 3 y 4. Escasos registros en 2.

Charadrius falklandicus Latham 1790 **RB pm**

Chorlito Doble Collar

Distribución: Areas 1, 3 y 4. Escasos registros en 2.

Observaciones: Migratorio.

Charadrius semipalmatus Bonaparte 1825 **RB pm**

Chorlito Palmado

Distribución: Escasos registros en áreas 1, 4 y costa atlántica de 3.

Observaciones: Migratorio.

Charadrius modestus (Lichtenstein 1823) **RB pm**

Chorlito Pecho Canela

Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4.

Observaciones: Migratorio.

Oreopholus ruficollis (Wagler 1829) **RB pm**

Chorlo Cabezón

Distribución: Toda la provincia.

Pluvianellus socialis G. R. Gray 1846 **RB pv**

Chorlito Ceniciento

Distribución: Escasos registros en área 4.

Familia HAEMATOPODIDAE

Haematopus palliatus Temminck 1820 **RB pm**

Ostrero Común

Distribución: Costa atlántica de área 3. Escasos registros en 4.

Haematopus leucopodus Garnat 1826 **RB pm**

Ostrero Austral

Distribución : Escasos registros en costas de área 3.

Familia RECURVIROSTRIDAE

Himantopus mexicanus Seebohm 1886 **RB pm**

Tero-real

Distribución: Toda la provincia.

Familia JACANIDAE

Jacana jacana Linné 1766 **RB pm**

Jacana

Distribución: Area 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4.

Familia ROSTRATULIDAE

Nycticryphes semicollaris Vieillot 1816 **RB pm**

Aguatero

Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2.

Familia SCOLOPACIDAE

Tringa melanoleuca (Gmelin 1789) **RB pm**

Pitotoy Grande

Distribución: Toda la provincia.

Observaciones: Migratorio.

Tringa flavipes (Gmelin 1789) **RB pm**

Pitotoy Chico

Distribución: Toda la provincia.

Observaciones: Migratorio.

Tringa solitaria Wilson 1813 **RB pm**

Pitotoy Solitario

Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4.

Observaciones: Migratorio.

Actitis macularia (Linné 1766) **RB pm**

Playerito Manchado

Distribución: Escasos registros en áreas 1 y 3.

Observaciones: Migratorio.

Bartramia longicauda (Bechstein 1802) **RB pv**

Batitú

Distribución: Area 1. Escasos registros en 2, 3 y 4.

Observaciones: Migratorio.

Numenius phaeopus (Linné 1758) **RB pm**

Playero Trinador

Distribución: Escasos registros en áreas 1 y costa atlántica de 3.

Observaciones: Migratorio.

Limosa haemastica (Linné 1758) **RB pv**

Becasa de Mar

Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4.

Arenaria interpres (Linné 1758) **RB pm**

Vuelvepiedras

Distribución: Costa atlántica de área 3 y un registro ocasional en norte de área 4.

Observaciones: Migratorio.

Calidris canutus (Linné 1758) **RB pm**

Playero Rojizo

Distribución: Costa atlántica de área 3. Escasos registros costa atlántica de 1 y 4.

Observaciones: Migratorio.

Calidris alba (Pallas 1764) **RB pm**

Playerito Blanco

Distribución: Costa atlántica de área 3. Escasos registros en 1.

Observaciones: Migratorio.

Calidris fuscicollis (Vieillot 1819) **RB pm**

Playerito Rabadilla Blanca

Distribución: Areas 1, 3 y 4. Escasos registros en 2.

Observaciones: Migratorio.

Calidris bairdii (Coues 1861) **RB pm**

Playerito Unicolor

Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 4.

Observaciones: Migratorio.

Calidris melanotos (Vieillot 1819) **RB pm**

Playerito Pectoral
Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2.
Observaciones: Migratorio.

Calidris himantopus (Bonaparte 1826) **RB pm**
Playero Zancudo
Distribución: Area 1. Escasos registros en 3.
Observaciones: Migratorio.

Tryngites subruficollis (Vieillot 1819) **RB pv**
Playerito Canela
Distribución: Area 1. Escasos registros en 3.
Observaciones: Migratorio.

Limnodromus scolopaceus (Say 1823) **RB pm**
Becasina Boreal
Distribución: Escasos registros en área 3 y norte de 4.
Observaciones: Migratorio.

Gallinago paraguaiaae Vieillot 1816 **RB pm**
Becasina Común
Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4.

Phalaropus tricolor (Vieillot 1819) **RB pm**
Faloropo Común
Distribución: Areas 1, 3 y 4. Escasos registros en 2.
Observaciones: Migratorio.

Familia THINOCORIDAE

Thinocorus rumicivorus Eschscholtz 1829 **RB pm**
Agachona Chica
Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4.
Observaciones: Migratorio.

Familia CHIONIDIDAE

Chionis alba (Gmelin 1789) **RB pm**
Paloma-antártica
Distribución: Costa atlántica de área 3. Escasos registros en 4.
Observaciones: Migratorio.

Familia LARIDAE

Stercorarius parasiticus (Linné 1758) **RB pm**

Salteador Chico

Distribución: Costa atlántica de área 3. Escasos registros en 4.

Observaciones: Migratorio.

Catharacta chilensis (Bonaparte 1857) **RB pm**

Escúa Común

Distribución: Escasos registros en área 3.

Observaciones: Migratorio.

Larus belcheri Vigors 1829 **RB pv**

Gaviota Cangrejera

Distribución: Costa atlántica en áreas 1, 3 y 4.

Larus dominicanus Lichtenstein 1823 **RB pm**

Gaviota Cocinera

Distribución: Toda la provincia.

Larus cirrocephalus Vieillot 1818 **RB pm**

Gaviota Capucho Gris

Distribución: Areas 1, 3 y norte de 4. Escasos registros en 2.

Larus maculipennis Lichtenstein 1823 **RB pm**

Gaviota Capucho Café

Distribución: Toda la provincia.

Chlidonias niger (Linné 1758) **RB pm**

Gaviotín Negro

Distribución: Escasos registros en área 3.

Observaciones: Migratorio.

Phaetusa simplex (Gmelin 1789) **RB pm**

Atí

Distribución: Escasos registros en área 1.

Sterna nilotica Gmelin 1789 **RB pm**

Gaviotín Pico Grueso

Distribución: Escasos registros en toda la provincia.

Sterna hirundinacea Lesson 1831 **RB pm**

Gaviotín Sudamericano

Distribución: Costa atlántica en área 3. Escasos registros en 1 y 4.

Observaciones: Migratorio.

Sterna hirundo Linné 1758 **RB pm**
Gaviotín Golondrina
Distribución: Escasos registros en costa atlántica de área 3.
Observaciones: Migratorio.

Sterna trudeaui Audubon 1838 **RB pm**
Gaviotín Lagunero
Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4.

Sterna superciliaris Vieillot 1819 **RB pm**
Gaviotín Chico Común
Distribución: Escasos registros en áreas 1 y 3.

Sterna maxima Boddaert 1783 **DI**
Gaviotín Real
Distribución: Escasos registros en costa del río de la Plata y costa atlántica de áreas 3 y 4.

Sterna sandvicensis Latham 1787 **RB pm**
Gaviotín Pico Amarillo
Distribución: Escasos registros en costa atlántica de áreas 3 y 4.

Rynchops niger Linné 1758 **RB pm**
Rayador
Distribución: Costa del río de la Plata y costa atlántica en áreas 1, 3 y norte de 4.

Orden COLUMBIFORMES

Familia COLUMBIDAE

Columba picazuro Temminck 1813 **RB pm**
Paloma Picazuró
Distribución: Toda la provincia.
Columba maculosa Temminck 1813 **RB pm**
Paloma Manchada
Distribución: Areas 1, 2 y 4. Escasos registros en 3.

Zenaida auriculata (Des Murs 1847) **RB pm**
Torcaza
Distribución: Toda la provincia.

Columbina talpacoti (Temminck 1811) **RB pm**
Torcacita Colorada
Distribución: Escasos registros en el norte del área 1.

Columbina picui (Temminck 1813) **RB pm**

Torcacita Común
Distribución: Toda la provincia.

Leptotila verreauxi (Bonaparte 1855) **RB pm**
Yerutí Común
Distribución: Areas 1 y 3.

Orden PSITTACIFORMES

Familia PSITTACIDAE

Aratinga acuticaudata (Vieillot 1817) **RB pm**
Calancate Común
Distribución: Escasos registros en áreas 2 y 4.

Aratinga leucophthalmus (Müller 1776) **RB pm**
Calancate Ala Roja
Distribución: Area 1.
Observaciones: Población originada por ejemplares de cautiverio.

Nandayus nenday (Vieillot 1823) **RB pm**
Ñanday
Distribución: Area 1.
Observaciones: Población originada por ejemplares de cautiverio.

Cyanoliseus patagonus (Vieillot 1817) **RB pm**
Loro Barranquero
Distribución: Areas 3 y 4. Escasos registros en 1 y 2.

Pyrrhura frontalis (Vieillot 1818) **RB pm**
Chiripepe Cabeza Verde
Distribución: Escasos registros en área 1.
Observaciones: Población originada por ejemplares de cautiverio.

Myiopsitta monachus (Boddaert 1783) **RB pm**
Cotorra
Distribución: Toda la provincia.

Orden CUCULIFORMES

Familia CUCULIDAE

Coccyzus cinereus Vieillot 1817 **RB pm**
Cuclillo Chico

Distribución: Areas 1 y 4.

Coccyzus americanus (Linné 1758) **RB pm**

Cuclillo Pico Amarillo

Distribución: Area 1.

Observaciones: Migratorio.

Coccyzus melacoryphus Vieillot 1817 **RB pm**

Cuclillo Canela

Distribución: Area 1. Escasos registros en 2, 3 y 4.

Piaya cayana (Linné 1766) **RB pm**

Tingazú

Distribución: Area 1.

Tapera naevia (Linné 1766) **RB pm**

Crespín

Distribución: Area 1.

Crotophaga ani Linné 1758 **RB pm**

Anó Chico

Distribución: Escasos registros en norte de área 1.

Guira guira (Gmelin 1788) **RB pm**

Pirincho

Distribución: Toda la provincia

Orden STRIGIFORMES

Familia TYTONIDAE

Tyto alba (Scopoli 1769) **RB pm**

Lechuza-de-campanario

Distribución: Areas 1, 2 y 3. Escasos registros en 4.

Familia STRIGIDAE

Otus choliba (Vieillot 1817) **RB pm**

Alilicucu Común

Distribución: Area 1.

Bubo virginianus (Gmelin 1788) **RB pm**

Ñacurutú

Distribución: Escasos registros en toda la provincia.

Glaucidium brasilianum (Gmelin 1788) **RB pm**

Caburé Chico

Distribución: Area 1.

Glaucidium nanum (King 1827) **RB pm**

Caburé Grande

Distribución: Escasos registros en área 4.

Athene cunicularia Gould 1841 **RB pm**

Lechucita Vizcachera

Distribución: Toda la provincia.

Asio clamator (Vieillot 1807) **RB pm**

Lechuzón Orejudo

Distribución: Area 1.

Asio flammeus (Pontoppidan 1763) **RB pm**

Lechuzón de Campo

Distribución: Toda la provincia.

Orden CAPRIMULGIFORMES

Familia CAPRIMULGIDAE

Chordeiles minor (Forster 1771) **RB pm**

Añapero Boreal

Distribución: Escasos registros en áreas 1, 3 y 4.

Observaciones: Migratorio.

Podager nacunda (Vieillot 1817) **RB pm**

Ñacundá

Distribución: Area 1. Escasos registros en 3.

Observaciones: Migratorio.

Caprimulgus longirostris Bonaparte 1825 **RB pm**

Atajacaminos Ñañarca

Distribución: Area 1. Escasos registros en 2, 3 y 4.

Observaciones: Migratorio.

Caprimulgus parvulus Gould 1837 **RB pm**

Atajacaminos Chico

Distribución: Area 1. Escasos registros en 2 y 3.

Observaciones: Migratorio.

Hydropsalis brasiliana (Gmelin 1789) **RB pm**

Atajacaminos Tijera Común

Distribución: Escasos registros en toda la provincia.
Observaciones: Migratorio.

Orden APODIFORMES

Familia TROCHILIDAE

Chlorostilbon aureoventris (d'Orbigny & Lafresnaye 1838) **RB pm**

Picaflor Común

Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4.

Hylocharis chrysura (Shaw 1812) **RB pm**

Picaflor Bronceado

Distribución: Area 1. Escasos registros en 3.

Leucochloris albicollis (Vieillot 1818) **RB pm**

Picaflor Garganta Blanca

Distribución: Area 1 y norte de 4. Costa atlántica de 3.

Patagona gigas (Vieillot 1824) **RB pm**

Picaflor Gigante

Distribución: Escasos registros en área 1 y 3.

Sephanoides sephaniodes (Lesson 1826) **RB pm**

Picaflor Rubí

Distribución: Escasos registros en áreas 2 y 3.

Observaciones: Migratorio.

Helimaster furcifer (Shaw 1812) **RB pm**

Picaflor de Barbijo

Distribución: Escasos registros en área 1.

Observaciones: Migratorio.

Orden CORACIIFORMES

Familia ALCEDINIDAE

Ceryle torquata (Linné 1766) **RB pm**

Martín Pescador Grande

Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2.

Chloroceryle amazona (Latham 1790) **RB pm**

Martín Pescador Mediano

Distribución: Area 1. Escasos registros en 3.

Chloroceryle americana (Gmelin 1788) **RB pm**

Martín Pescador Chico

Distribución: Area 1. Escasos registros en 2 y 3.

Orden PICIFORMES

Familia PICIDAE

Picumnus cirratus Temminck 1825 **RB pm**

Carpinterito Común

Distribución: Escasos registros en norte de área 1.

Melanerpes candidus (Otto 1796) **RB pm**

Carpintero Blanco

Distribución: Escasos registros en área 1.

Picoides mixtus (Boddaert 1783) **RB pm**

Carpintero Bataraz Chico

Distribución: Areas 1 y 4.

Colaptes melanochloros (Gmelin 1788) **RB pm**

Carpintero Real

Distribución: Toda la provincia.

Colaptes campestris (Vieillot 1818) **RB pm**

Carpintero Campestre

Distribución: Toda la provincia.

Orden PASSERIFORMES

Familia DENDROCOLAPTIDAE

Drymornis bridgesii (Eyton 1849) **RB pm**

Chincheró Grande

Distribución: Escasos registros en áreas 1 y 4.

Lepidocolaptes angustirostris (Vieillot 1818) **RB pm**

Chincheró Chico

Distribución: Area 1. Escasos registros en 2, 3 y 4.

Familia FURNARIIDAE

Geositta cunicularia (Vieillot 1816) **RB pm**

Caminera Común
Distribución: Toda la provincia.

Upucerthia dumetaria Geoffroy St. Hilaire 1832 **RB pm**
Bandurrita Común
Distribución: Area 4. Escasos registros en 1, 2 y 3.

Upucerthia certhioides (d'Orbigny & Lafresnaye 1838) **RB pm**
Bandurrita Chaqueña
Distribución: Escasos registros en áreas 1 y 4.

Cinclodes fuscus (Vieillot 1818) **RB pm**
Remolinera Común
Distribución: Toda la provincia.

Furnarius rufus (Gmelin 1788) **RB pm**
Hornero
Distribución: Toda la provincia.

Limnornis curvirostris Gould 1839 **RB pm**
Pajonalera Pico Curvo
Distribución: Area 1.

Limnortyx rectirostris (Gould 1839) **EP**
Pajonalera Pico Recto
Distribución: Escasos registros en área 1.

Pheocryptes melanops (Vieillot 1817) **RB pm**
Junquero
Distribución: Areas 1, 2 y 3. Escasos registros en 4.

Leptasthenura aegithaloides (Kittlitz 1830) **RB pm**
Coludito Cola Negra
Distribución: Area 4. Escasos registros en 1.

Leptasthenura platensis Reichenbach 1853 **RB pm**
Coludito Copetón
Distribución: Areas 1, 3 y 4. Escasos registros en 2.

Schoeniophylax phryganophila (Vieillot 1817) **RB pm**
Chotoy
Distribución: Area 1.

Synallaxis frontalis Pelzeln 1859 **RB pm**
Pijuí Frente Gris
Distribución: Area 1.

Synallaxis spixi Sclater 1856 **RB pm**

Pijú Plomizo
Distribución: Area 1.

Synallaxis albescens Temminck 1823 **RB pm**
Pijú Cola Parda
Distribución: Areas 1, 2 y 4. Escasos registros en 3.

Certhiaxis cinnamomea (Gmelin 1788) **RB pm**
Curutié Colorado
Distribución: Area 1.

Cranioleuca sulphurifera (Burmeister 1868) **RB pm**
Curutié Ocráceo
Distribución: Areas 1 y 3.

Cranioleuca pyrrophia (Vieillot 1818) **RB pm**
Curutié Blanco
Distribución: Areas 1 y 4.

Asthenes pyrrholeuca (Vieillot 1817) **RB pm**
Canastero Coludo
Distribución: Area 4. En invierno se desplaza hacia el norte.

Asthenes baeri (Berlepsch 1906) **RB pm**
Canastero Chaqueño
Distribución: Areas 1 y 4. Escasos registros en 2 y 3.

Asthenes patagonica (d'Orbigny 1839) **RB pm**
Canastero Patagónico
Distribución: Escasos registros en área 4.

Asthenes modesta (Eyton 1851) **RB pm**
Canastero Pálido
Distribución: Escasos registros en área 4.

Asthenes hudsoni (Sclater 1874) **DI**
Espartillero Pampeano
Distribución: Areas 1, 2 y 3.

Spartonoica maluroides (d'Orbigny & Lafresnaye 1837) **RB pm**
Espartillero Enano
Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4.

Phacellodomus sibilatrix (Sclater 1879) **RB pm**
Espinero Chico
Distribución: Area 1.

Phacellodomus ruber (Vieillot 1817) **RB pm**

Espinero Grande

Distribución: Escasos registros en área 1.

Phacellodomus striaticollis (d'Orbigny & Lafresnaye 1838) **RB pm**

Espinero Pecho Manchado

Distribución: Areas 1, 3 y escasos registros en el norte de 4.

Coryphistera alaudina Burmeister 1860 **RB pm**

Crestudo

Distribución: Norte del área 4.

Anumbius annumbi (Vieillot 1817) **RB pm**

Leñatero

Distribución: Toda la provincia.

Pseudoseisura lophotes (Reichenbach 1853) **RB pm**

Cacholote Castaño

Distribución: Area 4. Escasos registros en 1 y 2.

Pseudoseisura gutturalis (d'Orbigny & Lafresnaye 1838) **RB pm**

Cacholote Pardo

Distribución: Area 4.

Syndactyla rufosuperciliata (Lafresnaye 1832) **RB pm**

Ticotico Común

Distribución: Area 1.

Familia FORMICARIIDAE

Thamnophilus caerulescens (Vieillot 1816) **RB pm**

Choca Común

Distribución: Area 1.

Thamnophilus ruficapillus (Vieillot 1816) **RB pm**

Choca Corona Rojiza

Distribución: Area 1.

Familia RHINOCRYPTIDAE

Rhinocrypta lanceolata (Geoffroy St. Hilaire 1832) **RB pm**

Gallito Copetón

Distribución: Area 4.

Familia TYRANNIDAE

Camptostoma obsoletum (Temminck 1824) **RB pm**

Piojito Silbón

Distribución: Escasos registros en área 1.

Sublegatus modestus (Wied 1831) **RB pm**

Suirirí Pico Corto

Distribución: Escasos registros en áreas 1, 3 y 4.

Suiriri suiriri (Vieillot 1818) **RB pm**

Suirirí Común

Distribución: Area 1. Escasos registros en 3 y 4.

Elaenia spectabilis Pelzeln 1868 **RB pm**

Fiofío Grande

Distribución: Area 1.

Observaciones: Migratorio.

Elaenia albiceps (d'Orbigny & Lafresnaye 1837) **RB pm**

Fiofío Silbón

Distribución: Escasos registros en áreas 1, 3 y 4.

Elaenia parvirostris Pelzeln 1868 **RB pm**

Fiofío Pico Corto

Distribución: Areas 1 y 3.

Serpophaga nigricans (Vieillot 1817) **RB pm**

Piojito Gris

Distribución: Areas 1, 3 y 4. Escasos registros en 2.

Serpophaga subcristata (Vieillot 1817) **RB pm**

Piojito Común

Distribución: Toda la provincia.

Serpophaga griseiceps Berlioz 1959 **RB pm**

Piojito Trinador

Distribución: Escasos registros en área 4.

Stigmatura budytoides (d'Orbigny & Lafresnaye 1837) **RB pm**

Calandrita

Distribución: Area 4.

Anairetes flavirostris Sclater & Salvin 1876 **RB pm**

Cachudito Pico Amarillo

Distribución: Escasos registros en toda la provincia.

Anairetes parulus (Kittlitz 1830) **RB pm**

Cachudito Pico Negro

Distribución: Area 4. Escasos registros en 3.

Tachuris rubrigastra (Vieillot 1817) **RB pm**

Tachurí Sietecolores

Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4.

Polystictus pectoralis (Vieillot 1817) **RB pv**

Tachurí Canela

Distribución: Escasos registros en toda la provincia.

Pseudocoloteryx sclateri (Oustalet 1892) **RB pm**

Doradito Copetón

Distribución: Area 1.

Pseudocolopteryx flaviventris (d'Orbigny & Lafresnaye 1837) **RB pm**

Doradito Común

Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4.

Euscarthmus meloryphus Wied 1831 **RB pm**

Barullero

Distribución: Area 1.

Phylloscartes ventralis (Temminck 1824) **RB pm**

Mosqueta Común

Distribución: Area 1.

Hemitriccus margaritaceiventer (d'Orbigny y Lafresnaye 1837) **RB pm**

Mosqueta Ojo Dorado

Distribución: Escasos registros en área 1.

Myiophobus fasciatus (Müller 1776) **RB pm**

Mosqueta Estriada

Distribución: Area 1. Escasos registros en 3.

Lathrotriccus euleri (Cabanis 1868) **RB pm**

Mosqueta Parda

Distribución: Area 1.

Pyrocephalus rubinus (Boddaert 1783) **RB pm**

Churrinche

Distribución: Toda la provincia.

Xolmis cinerea (Vieillot 1816) **RB pm**

Monjita Gris

Distribución: Area 1.

Xolmis coronata (Vieillot 1823) **RB pm**

Monjita Coronada

Distribución: Area 4. En invierno se desplaza hacia las áreas 1 y 3.

Xolmis dominicana (Vieillot 1823) **VU**

Monjita Dominica

Distribución: Escasos registros en áreas 1 y 3.

Xolmis irupero (Vieillot 1823) **RB pm**

Monjita Blanca

Distribución: Areas 2 y 4. Migra al norte en invierno.

Neoxolmis rubetra (Burmeister 1860) **RB pm**

Monjita Castaña

Distribución: Escasos registros en áreas 1 y 4.

Neoxolmis rufiventris (Vieillot 1823) **RB pm**

Monjita Chocolate

Distribución: Toda la provincia.

Observaciones: Migratoria.

Agriornis montana (d'Orbigny & Lafresnaye 1837) **RB pm**

Gaucho Serrano

Distribución: Escasos registros en área 4.

Agriornis microptera Gould 1839 **RB pm**

Gaucho Gris

Distribución: Escasos registros en toda la provincia.

Agriornis murina (d'Orbigny & Lafresnaye 1837) **RB pm**

Gaucho Chico

Distribución: Escasos registros en toda la provincia.

Observaciones: Migratorio.

Muscisaxicola macloviana (Garnot 1829) **RB pm**

Dormilona Cara Negra

Distribución: Areas 1, 3 y 4. Escasos registros en 2.

Observaciones: Migratorio.

Lessonia rufa (Gmelin 1783) **RB pm**

Sobrepuesto Común

Distribución: Toda la provincia.

Observaciones: Migratorio.

Knipolegus hudsoni (Sclater 1872) **VU**

Viudita Chica

Distribución: Area 4.

Knipolegus cyanirostris (Vieillot 1818) **RB pm**

Viudita Pico Celeste

Distribución: Area 1.

Knipolegus aterrimus (Kaup 1853) **RB pm**

Viudita Común

Distribución: Escasos registros en áreas 1, 2 y 4.

Hymenops perspicillata (Gmelin 1789) **RB pm**

Pico de Plata

Distribución: Toda la provincia.

Fluvicola pica (Boddaert 1783) **RB pm**

Viudita Blanca

Distribución: Area 1.

Satrapa icterophrys (Vieillot 1818) **RB pm**

Suirirí Amarillo

Distribución: Areas 1, 3 y escasos registros en el norte de 4.

Machetornis rixosa (Vieillot 1819) **RB pm**

Picabuey

Distribución: Toda la provincia.

Casiornis rufa (Vieillot 1816) **RB pm**

Burlisto Castaño

Distribución: Escasos registros en área 1.

Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine 1859 **RB pm**

Burlisto Pico Canela

Distribución: Area 1.

Pitangus sulphuratus (Linné 1766) **RB pm**

Benteveo Común

Distribución: Toda la provincia.

Myiodynastes maculatus (Müller 1776) **RB pm**

Benteveo Rayado

Distribución: Area 1 y escasos registros en el norte de área 4.

Empidonomus aurantioatrocristatus (d'Orbigny & Lafresnaye 1837) **RB pm**

Tuquito Gris

Distribución: Escasos registros en áreas 1 y 4.

Tyrannus melancholicus Vieillot 1819 **RB pm**

Suirirí Real

Distribución: Toda la provincia.

Tyrannus savana (Linné 1766) **RB pm**

Tijereta

Distribución: Toda la provincia.

Observaciones: Migratoria.

Xenopsaris albinucha (Burmeister 1869)

Tijerilla

Distribución: Area 1.

Pachyramphus viridis (Vieillot 1816) **RB pm**

Anambé Verdoso

Distribución: Escasos registros en área 1.

Pachyramphus polychopterus (Vieillot 1818) **RB pm**

Anambé Común

Distribución: Area 1. Escasos registros en 3.

Familia PHYTOTOMIDAE

Phytotoma rutila Vieillot 1818 **RB pm**

Cortarramas

Distribución: Areas 1 y 4. Escasos registros en 2 y 3.

Observaciones: Migratorio.

Familia HIRUNDINIDAE

Tachycineta leucorrhoa (Vieillot 1817) **RB pm**

Golondrina Ceja Blanca

Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4.

Observaciones: Migratoria.

Tachycineta leucopyga (Meyen 1834) **RB pm**

Golondrina Patagónica

Distribución: Area 1. Escasos registros en 2, 3 y 4.

Observaciones: Migratoria.

Phaeoprogne tapera (Linné 1766) **RB pm**

Golondrina Parda

Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 4.

Observaciones: Migratoria.

Progne chalybea (Gmelin 1789) **RB pm**

Golondrina Doméstica

Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros para el norte de 4.

Observaciones: Migratoria.

Progne elegans Baird 1865 **RB pm**
Golondrina Negra
Distribución: Areas 1, 3 y 4. Escasos registros en 2.
Observaciones: Migratoria.

Notiochelidon cyanoleuca (Vieillot 1817) **RB pm**
Golondrina Barranquera
Distribución: Areas 1, 3 y 4. Escasos registros en 2.
Observaciones: Migratoria.

Alopochelidon fucata (Temminck 1822) **RB pm**
Golondrina Cabeza Rojiza
Distribución: Area 1.
Observaciones: Migratoria.

Riparia riparia (Linné 1758) **RB pm**
Golondrina Zapadora
Distribución: Escasos registros en áreas 1, 3 y 4.
Observaciones: Migratoria.

Hirundo rustica Linné 1758 **RB pm**
Golondrina Tijerita
Distribución: Areas 1 y 3.
Observaciones: Migratoria.

Hirundo pyrrhonota (Vieillot 1817) **RB pm**
Golondrina Rabadilla Canela
Distribución: Areas 1 y 3.
Observaciones: Migratoria.

Familia TROGLODYTIDAE

Cistothorus platensis (Latham 1790) **RB pm**
Ratona Aperdizada
Distribución: Escasos registros en toda la provincia.

Troglodytes aedon Vieillot 1808 **RB pm**
Ratona Común
Distribución: Toda la provincia.

Familia MUSCICAPIDAE

Poliophtila dumicola (Vieillot 1817) **RB pm**
Tacuarita Azul

Distribución: Areas 1 y 3.

Turdus rufiventris Vieillot 1818 **RB pm**

Zorzal Colorado

Distribución: Areas 1 y 3.

Turdus falcklandii Quoy & Gaimard 1824 **RB pm**

Zorzal Patagónico

Distribución: Area 4.

Turdus amaurochalinus Cabanis 1851 **RB pm**

Zorzal Chalchalero

Distribución: Area 1. Escasos registros en 3 y 4.

Familia MIMIDAE

Mimus saturninus (Lichtenstein 1823) **RB pm**

Calandria Grande

Distribución: Toda la provincia.

Mimus patagonicus (d'Orbigny & Lafresnaye 1837) **RB pm**

Calandria Mora

Distribución: Area 4. Escasos registros en 1, 2 y 3.

Observaciones: Migratoria.

Mimus triurus (Vieillot 1818) **RB pm**

Calandria Real

Distribución: Toda la provincia.

Familia MOTACILLIDAE

Anthus furcatus d'Orbigny & Lafresnaye 1837 **RB pm**

Cachirla Uña Corta

Distribución: Toda la provincia.

Anthus hellmayri Hartert 1909 **RB pm**

Cachirla Pálida

Distribución: Escasos registros en áreas 1 y 4.

Anthus lutescens Pucheran 1855 **RB pm**

Cachirla Chica

Distribución: Area 1. Escasos registros en 3.

Anthus chacoensis (Zimmer 1952) **RB pm**

Cachirla Trinadora

Distribución: Escasos registros en área 3.

Anthus correndera Vieillot 1818 **RB pm**
Cachirla Común
Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4.

Familia VIREONIDAE

Vireo olivaceus (Linné 1766) **RB pm**
Chiví Común
Distribución: Area 1.

Cyclarhis gujanensis Gmelin 1789 **RB pm**
Juan Chiviro
Distribución: Area 1.

Familia EMBERIZIDAE

Parula pitiayumi (Vieillot 1817) **RB pm**
Pitiayumí
Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 4.

Geothlypis aequinoctialis (Gmelin 1789) **RB pm**
Arañero Cara Negra
Distribución: Area 1.

Basileuterus culicivorus (Lichtenstein 1830) **RB pm**
Arañero Coronado Chico
Distribución: Area 1.

Basileuterus leucoblepharus (Vieillot 1817) **RB pm**
Arañero Silbón
Distribución: Escasos registros en el norte de área 1.

Pipraeidea melanonota (Vieillot 1819) **RB pm**
Saíra de Antifaz
Distribución: Area 1 y escasos registros en 3.

Euphonia chlorotica (Linné 1766) **RB pm**
Tangará Común
Distribución: Escasos registros en el norte de área 1.

Stephanophorus diadematus (Temminck 1823) **RB pm**
Frutero Azul
Distribución: Norte de área 1.

Thraupis sayaca (Linné 1766) **RB pm**

Celestino Común

Distribución: Area 1.

Thraupis bonariensis (Gmelin 1789) **RB pm**

Naranjero

Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2 y 4.

Piranga flava (Vieillot 1822) **RB pm**

Fueguero Común

Distribución: Area 1.

Tachyphonus rufus (Boddaert 1783) **RB pm**

Frutero Negro

Distribución: Area 1.

Saltator coerulescens Vieillot 1817 **RB pm**

Pepitero Gris

Distribución: Area 1.

Saltator aurantirostris Vieillot 1817 **RB pm**

Pepitero de Collar

Distribución: Areas 1 y 4.

Cyanocompsa cyanea (Linné 1758) **RB pm**

Reinamora Grande

Distribución: Area 1.

Cyanoloxia glaucocaerulea (d'Orbigny & Lafresnaye 1837) **RB pm**

Reinamora Chica

Distribución: Area 1.

Paroaria coronata (Miller 1776) **RB pm**

Cardenal Común

Distribución: Areas 1 y 3.

Paroaria capitata (d'Orbigny & Lafresnaye 1837) **RB pm**

Cardenilla

Distribución: Area 1.

Coryphospingus cucullatus (Müller 1776) **RB pm**

Brasita de Fuego

Distribución: Area 1 y escasos registros en 3.

Saltatricula multicolor (Burmeister 1860) **RB pm**

Pepitero Chico

Distribución: Escasos registros en el norte de área 4 y sur de 3.

Gubernatrix cristata (Vieillot 1817) **RB pm**

Cardenal Amarillo

Distribución: Areas 1 y 4.

Catamenia analis analis (d'Orbigny y Lafresnaye 1837) **RB pm**

Piquitodeoro Común

Distribución: Escasos registros en el límite sur del Area 3.

Sporophila caerulescens (Vieillot 1817) **RB pm**

Corbatita Común

Distribución: Areas 1, 2 y 3. Escasos registros en 4.

Sporophila collaris (Boddaert 1783) **RB pm**

Corbatita Dominó

Distribución: Area 1.

Sporophila hypoxantha Cabanis 1831 **RB pv**

Capuchino Canela

Distribución: Escasos registros en área 1.

Sporophila ruficollis Cabanis 1851 **RB pv**

Capuchino Garganta Café

Distribución: Escasos registros en áreas 1 y 3.

Sporophila palustris (Barrows 1883) **VU**

Capuchino Pecho Blanco

Distribución: Escasos registros en área 1.

Sporophila hypochroma Todd 1915 **RB pm**

Capuchino Castaño

Distribución: Escasos registros en área 1.

Sporophila cinnamomea (Lafresnaye 1939) **VU**

Capuchino Corona Gris

Distribución: Escasos registros en área 1.

Volatinia jacarina (Linné 1766) **RB pm**

Volatinero

Distribución: Area 1.

Embernagra platensis (Gmelin 1789) **RB pm**

Verdón

Distribución: Toda la provincia.

Sicalis lebruni (Oustalet 1891) **RB pm**

Jilguero Austral

Distribución: Escasos registros en área 4.

Sicalis flaveola (Linné 1766) **RB pm**

Jilguero Dorado

Distribución: Toda la provincia.

Sicalis luteola (Sparrman 1789) **RB pm**

Misto

Distribución: Toda la provincia.

Poospiza torquata (d'Orbigny & Lafresnaye 1837) **RB pm**

Monterita de Collar

Distribución: Area 4.

Poospiza cinerea Bonaparte 1851 **RB pm**

Monterita Cabeza Negra

Distribución: Area 1.

Poospiza nigrorufa (d'Orbigny & Lafresnaye 1837) **RB pm**

Sietevestidos

Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 4.

Poospiza ornata (Leybold 1865) **RB pm**

Monterita Canela

Distribución: Escasos registros en áreas 1, 3 y 4.

Poospiza lateralis (Nordmann 1835) **RB pm**

Monterita Litoral

Distribución: Area 1.

Diuca diuca (Molina 1782) **RB pm**

Diuca Común

Distribución: Area 4.

Donacospiza albifrons (Vieillot 1817) **DI**

Cachilo Canela

Distribución: Areas 1 y 3.

Phrygilus fruticeti (Kittlitz 1832) **RB pm**

Yal Negro

Distribución: Area 4. Escasos registros en 3.

Phrygilus carbonarius (d'Orbigny & Lafresnaye 1837) **RB pm**

Yal Carbonero

Distribución: Area 4.

Aimophila strigiceps (Gould y Darwin 1841) **RB pm**

Cachilo Corona Castaña

Distribución: Escasos registros en área 1.

Myiospiza humeralis (Bosc 1792) **RB pm**

Cachilo Ceja Amarilla

Distribución: Areas 1, 2 y 4.

Zonotrichia capensis (Müller 1776) **RB pm**

Chingolo

Distribución: Toda la provincia.

Molothrus bonariensis (Gmelin 1789) **RB pm**

Tordo Renegrado

Distribución: Toda la provincia.

Molothrus rufoaxillaris Cassin 1866 **RB pm**

Tordo Pico Corto

Distribución: Toda la provincia.

Molothrus badius (Vieillot 1819) **RB pm**

Tordo Músico

Distribución: Toda la provincia.

Cacicus chrysopterus (Vigors 1825) **RB pm**

Boyero Ala Amarilla

Distribución: Area 1.

Cacicus solitarius (Vieillot 1816) **RB pm**

Boyero Negro

Distribución: Area 1.

Agelaius thilius (Molina 1782) **RB pm**

Varillero Ala Amarilla

Distribución: Toda la provincia.

Agelaius ruficapillus Vieillot 1819 **RB pm**

Varillero Congo

Distribución: Areas 1 y 3. Escasos registros en 2.

Agelaius cyanopus Vieillot 1819 **RB pm**

Varillero Negro

Distribución: Area 1.

Icterus cayanensis (Linné 1766) **RB pm**

Boyerito

Distribución: Area 1.

Amblyramphus holosericeus (Scopoli 1786) **DI**

Federal

Distribución: Areas 1 y 3.

Pseudoleistes virescens (Vieillot 1819) **RB pm**

Pecho Amarillo Común

Distribución: Toda la provincia.

Sturnella superciliaris (Bonaparte 1850) **RB pm**

Pecho Colorado

Distribución: Areas 1, 2, 3 y norte de 4.

Sturnella defilippi (Bonaparte 1850) **EP**

Loica Pampeana

Distribución: Sur de áreas 2 y 3, y norte de 4.

Sturnella loyca (Linné 1771) **RB pm**

Loica Común

Distribución: Areas 3 y 4. Escasos registros en 1 y 2.

Familia FRINGILLIDAE

Carduelis magellanica (Vieillot 1805) **RB pm**

Cabecitanegra Común

Distribución: Toda la provincia.

Carduelis barbata (Molina 1782) **RB pm**

Cabecitanegra Austral

Distribución: Escasos registros en área 4.

LISTA DE LAS AVES INTRODUCIDAS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Orden COLUMBIFORMES

Familia COLUMBIDAE

Columba livia Gmelin 1879

Paloma Doméstica
Distribución: Toda la provincia.

Orden PASSERIFORMES

Familia STURNIDAE

Sturnus vulgaris Linné 1758

Estornino Pinto
Distribución: Area 1.

Acridotheres cristatellus (Linné 1766)

Estornino Crestado
Distribución: Areas 1 y 3.

Familia FRINGILLIDAE

Carduelis carduelis (Linné 1758)

Cardelino
Distribución: Escasos registros en área 1 y 3.

Carduelis chloris (Linné 1758)

Verderón
Distribución: Area 3. Escasos registros en 2 y 4.

Familia PLOCEIDAE

Passer domesticus (Linné 1758)

Gorrión
Distribución: Toda la provincia.

CONCLUSIONES PRELIMINARES

- Areas de interés para la protección de la avifauna en la provincia de Buenos Aires

Litoral atlántico: posee una gran variedad de ambientes acuáticos, entre los que se incluyen numerosas islas, islotes y bancos de baja altura, lagunas y bañados de aguas salobres, extensas zonas intermareales fangosas, playas de arena, de guijarros y de limo, y hacia el sur costas con barrancas. Las características ambientales de la zona la convierten

en un área de relevancia para la nidificación de numerosas especies de aves acuáticas y en una importante área de descanso e invernada para aves limícolas migratorias del Hemisferio Norte y de la Patagonia. Entre las especies marinas que se reproducen en esta zona costera se encuentran la Gaviota Cocinera (*Larus dominicanus*), la Gaviota Cangrejera (*Larus belcheri*), el Gaviotín Sudamericano (*Sterna hirundinacea*), el Gaviotín Real (*Sterna maxima*) y el Gaviotín Pico Amarillo (*Sterna sandvicensis*).

El conocimiento sobre la distribución y abundancia de estas aves en la costa sur de la provincia de Buenos Aires es aún escaso, debido principalmente a las características de los ambientes costeros que dificultan la logística necesaria para efectuar censos y relevamientos (Yorio *et al.*, 1998).

Albufera de Mar Chiquita: ubicada a 37° 38' S, 57° 24' O, representa la única albufera activa de la República Argentina. Es un gran espejo de agua salobre conectado con el mar, cuyo nivel está sujeto a pronunciadas variaciones. El fondo está constituido principalmente por arena y fango-arena, con algo de vegetación sedentaria. Cuando el nivel del agua es muy bajo, quedan al descubierto playas limosas de hasta 500 metros de ancho. Otros sectores poseen sedimentos de diatomeas y conchillas. Su superficie abarca 5800 hectáreas, con una longitud de 25 kilómetros y una profundidad máxima de cuatro metros. Sus aguas son más dulces en invierno, por la intensidad de las lluvias y el aporte de los arroyos. Es un ambiente propicio para aves migratorias del Hemisferio Norte, sobre todo limícolas de la familia Scolopacidae: Playero Rojizo (*Calidris canutus*), Playerito Rabadilla Blanca (*C. fuscicollis*) y Becasa de Mar (*Limosa haemastica*). La zona forma parte de la Reserva Integral Dunas del Atlántico Sur (partido de Mar Chiquita).

Serranías de Ventania: revisten un interés ornitológico especial dado que algunas aves de abolengo andino-patagónico habitan casi exclusivamente en altura, donde incluso se reproducen, como es el caso del Canastero Pálido (*Asthenes modesta*), el Gaucho Serrano (*Agriornis montana*), el Jilguero Austral (*Sicalis lebruni*) y el Piquitodeoro Común (*Catamenia analis*) (Narosky y Di Giácomo, 1993).

Delta e islas del Paraná: caracterizados por una alta biodiversidad, debido a la presencia relictual de selvas marginales del Dominio Amazónico, que alcanzan su límite austral en Punta Lara (Partido de Ensenada). Especies típicas como la Pava de Monte (*Penelope obscura*), el Ticotico Común (*Syndactyla rufosuperciliata*), la Choca Común (*Thamnophilus caerulescens*), la Mosqueta Común (*Phylloscartes ventralis*) y la Monterita Litoral (*Poospiza lateralis*) están sometidas a una fuerte presión antrópica, sobre todo por el crecimiento urbano e industrial. También las zonas de pajonales y juncales se encuentran muy degradadas, lo cual influye negativamente en las poblaciones de especies como el Burrito Colorado (*Laterallus leucopyrrhus*), la Pajonalera Pico Curvo (*Limnornis curvirostris*) y la Pajonalera Pico Recto (*Limnornis rectirostris*), entre otras (Narosky y Di Giácomo, 1993).

Talares: estos bosques semixerófilos del nordeste de la provincia actúan como un corredor para la fauna, permitiendo la penetración de especies del bosque chaqueño en el nordeste bonaerense, como es el caso del Espinero Chico (*Phacellodomus sibilatrix*), el Pepitero de Collar (*Saltator aurantirostris*), etc. Esta avifauna está en serio riesgo teniendo

en cuenta que de la distribución original de los talaes, sólo quedan relictos que siguen siendo degradados (Narosky y Di Giácomo, 1993).

Depresión del río Salado: caracterizan a esta área cuerpos de agua lénticos de distinto origen, tanto dulces como salobres, representados por lagunas, bañados, cañadas, etc. Como ejemplo podemos mencionar a las lagunas de Chascomús, Monte, Lobos, Salada Grande, etc. Estos ambientes son de real importancia para la preservación tanto de aves acuáticas que allí se reproducen y como de aves migratorias que utilizan sus playas para descanso y reabastecimiento durante sus largos viajes.

Pastizal: es un ecosistema relictual y un refugio para la fauna típica de la región. Entre las aves del pastizal que se ven afectadas por la modificación de este ambiente podemos mencionar al Ñandú (*Rhea americana*), la Colorada (*Rhynchotus rufescens*), el Cauquén Colorado (*Chloephaga rubidiceps*), el Chorlo Pampa (*Pluvialis dominica*) y la Loica Pampeana (*Sturnella defilippi*). Estas y otras aves nidifican entre matas de pasto, por lo que el reemplazo de la vegetación original ha disminuido la disponibilidad de espacio para la nidificación. Un trabajo reciente (Comparatore *et al*, 1996) en que se realizó un censo de aves y mamíferos en pastizales pampeanos de la provincia de Buenos Aires con predominio de paja colorada (*Paspalum quadrifarium*) manejados con fuego, demostró que del total de 39 especies de aves observadas en pastizales, 13 presentan una marcada dependencia con el pajonal, por requerimientos de alimento, refugio y nidificación; también, en el mismo trabajo, observaciones preliminares sobre el efecto del fuego seguido de pastoreo, obtenidas en un área quemada experimentalmente, mostraron un reemplazo de las aves ligadas al pajonal por especies que prefieren pastizales cortos como el Tero Común (*Vanellus chilensis*), el Chimango (*Milvago chimango*) y la Cachirla Común (*Anthus correndera*).

Caldenal: en el sudoeste bonaerense subsisten remanentes aislados de este Distrito, que constituyen el hábitat casi exclusivo, en la provincia, del Chinchero Grande (*Drymornis bridgesii*), la Bandurrita Chaqueña (*Upucerthia certhioides*), el Crestudo (*Coryphistera alaudina*) y la Monterita de Collar (*Poospiza torquata*), entre otras especies. Dado que este ambiente se halla muy restringido, la avifauna de la zona está en serio peligro, en especial algunas poblaciones no suficientemente conocidas.

BIBLIOGRAFIA

- Aguilar, H.A. y E.A. Kowalinski. 1996. Nota sobre la nidificación y la alimentación del Gavilán Mixto *Parabuteo unicinctus* en Buenos Aires. *Nuestras Aves*, 33: 30-31.
- Aguilar, H.A. y E.A. Kowalinski. 1996. Nidificación del Burrito Común (*Laterallus melanophaius*) en Hudson, Buenos Aires. *Nuestras Aves*, 35: 33.
- Altman, A. & B. Swift. 1989. *Checklist of the birds of South America*. St. Mary's Press, Washington, 82 pp.
- Babarskas, M., J. Veiga y F. Filiberto. 1992. Sobre la presencia invernal de algunas especies en las serranías de Ventania. *Nuestras Aves*, 27: 28-29.

- Bachmann, S. y J. P. Isacch. 1999. Ostrero Austral (*Haematopus leucopus*) en Mar de Cobo, provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves*, 40: 15.
- Belenguer, C. y S. Di Martino. 1993. Nidificación del Tuquito Gris (*Empidonamus aurantioatrocristatus*) en el sur de Buenos Aires. *Nuestras Aves*, 28: 26.
- Bertonatti, C., T. Narosky y V. Rodríguez Baiguera. 1994. Contribución al conocimiento de la avifauna de Martín García. *Nuestras Aves*, 30: 30-31.
- Blanco, D.E., P. González y M.M. Martínez. 1995. Migración de la Becasa de Mar, *Limosa haemastica* (Charadriiformes: Scolopacidae), en el sur de América del Sur. *Vida Silvestre Neotropical*, 4 (2): 119-124.
- Blanchard, A. 1996. Hallazgo del Carpinterito Común en el Delta del Paraná, Buenos Aires. *Nuestras Aves*, 33: 30.
- Bó, N.A. y C.A. Darrieu. 1991. Lista sistemática de las aves de la provincia de Buenos Aires. Situación ambiental de la provincia de Buenos Aires. A. Recursos y rasgos naturales en la evaluación ambiental. *Rev. C.I.C.*, Buenos Aires, Año 1 N° 8: 1-37.
- Bodrati, A., G. Bodrati y C.A. Ferrari. 1997. Presencia del Atí (*Phaetusa simplex*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 37: 6-7.
- Bodrati, A., G. Bodrati, C. Ferrari, E. Mérida y E. Haene. 1997. Notas sobre la avifauna del Baradero, provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras aves* 37: 2-4.
- Bodrati, A., C. Henschke y C. Nardini. 1997. Nuevas citas del género *Sporophila* para Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 37: 5.
- Camperi, A.R. 1992. Estudio sobre las aves colectadas en el extremo sudoeste de la provincia de Buenos Aires. *Neotrópica*, 38 (100): 127-140.
- Camperi, A.R. y C.A. Darrieu. 1995. Distribución geográfica de *Anthus hellmayri brasilianus* en la Argentina (Aves: Motacillidae). *Neotrópica*, 41 (105-106): 119-120.
- Canevari, M., P. Canevari, G. Carrizo, G. Harris, J. Rodríguez Mata y R. Straneck. 1991. *Nueva guía de las aves argentinas*. Tomo 1 y 2. Fundación Acindar.
- Canevari, P., D.E. Blanco, E. Bucher, G. Castro e I. Davidson. 1998. Los humedales de la Argentina, clasificación, situación actual, conservación y legislación. *Wetland International* N° 46: I-XIII+1-208.
- Carrete, M., K. Delhey y P. Petracci. 1996. Registro del Burrito Negruzco *Porzana spiloptera* en el sur de Buenos Aires. *Nuestras Aves*, 33: 29-30.

- Comparatore, V.M., M.M. Martínez, A.I. Vasallo, M. Barg y J.P. Isacch. 1996. Abundancia y relaciones con el hábitat de aves y mamíferos en pastizales de *Paspalum cuadrifarium* (Paja Colorada) manejados con fuego (Provincia de Buenos Aires, Argentina). *Interciencia*, 21 (4): 228-237.
- Chebez, J.C. y C.C. Bertonatti. 1991. Sobre la presencia de algunos loros subtropicales en Buenos Aires y alrededores (Aves: Psittaciformes: Psittacidae). *APRONA*, Bol. Cient. 19: 19-32.
- Chiurla, E.H. 1996. Nuevos registros del Chorlito Ceniciento (*Pluvianellus socialis*) en la provincia de Buenos Aires. *Nuestras Aves*, 35: 35-36.
- Chiurla, E.H. 1999. Nidificación del Estornino Crestado (*Acridotheres cristatellus*) en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. *Nuestras Aves*, 39: 6.
- Chiurla, E.H. y M.M. Martínez. 1995. Observaciones sobre el Estornino Crestado (*Acridotheres cristatellus*) en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. *Nuestras Aves*, 31: 24-25.
- Darrieu, C.A., A.R. Camperi y G.E. Soave. 2000. Nuevos registros de aves para el sur de la provincia de Buenos Aires. *Neotrópica*, 46: 36.
- Delhey, R. 1992. Algunas aves nuevas o poco conocidas para la región de Bahía Blanca. *Nuestras Aves*, 27: 31-32.
- Di Giácomo, A.G., A.S. Di Giácomo y M. Babarskas. 1993. Nuevos registros de *Sturnus vulgaris* y *Acridotheres cristatellus* en Buenos Aires. *Nuestras Aves*, 29: 32-37.
- Fernández, H.G. 1991. Nuevas aves para la provincia de Buenos Aires. *Nuestras Aves*, 24: 26.
- Ferrari, C. y C. Henschke. 1997. El Halconcito Gris (*Spizapteryx circumcinctus*) en la isla Martín García, provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves*, 36: 5.
- García Fernández, J.J., R.A. Ojeda, R.M. Fraga, G.B. Díaz y R.J. Baigún. 1997. *Libro Rojo de Mamíferos y Aves Amenazados de la Argentina*.
- Haene, E., M. Babarskas y S. Krapovickas. 1994. La avifauna de la Reserva Natural Otamenti. *Nuestras Aves*, 30: 4-5.
- Ianiro, J.L. 1999. Presencia del Cardelino (*Carduelis carduelis*) en Mar del Plata. *Nuestras Aves*, 40: 9-10.
- Kaspar, J., V. Delhey y M. Carrete. 1999. Aves nuevas o poco conocidas para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves*, 40: 11-12.

- Lando, R. y E. Haene. 1996. Carpintero Blanco (*Melanerpes candidus*) en la provincia de Buenos Aires. *Nuestras Aves*, 35: 34-35.
- Leveau, L. y C. Leveau. 1998. Visitantes invernales en el Partido de Benito Juárez, Provincia de Buenos Aires. *Nuestras Aves*, 38: 11-12.
- López, H.E. 1993. Algunas observaciones en Villa Gesell, Buenos Aires. *Nuestras Aves*, 29: 30.
- Luciano, D. 1998. Nuevas observaciones de la Monjita Castaña (*Neoxolmis rubetra*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves*, 38: 8-9.
- Maragliano, R.E. 1994. Nuevas localidades para *Leucochloris albicollis* (Aves, Trochilidae) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Neotrópica*, 40 (103-104): 34.
- Marateo, G., P. Rey y D. Glaz. 1998. Nuevo registro del Halconcito Gris (*Spizapteryx circumcinctus*) para el noreste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. (En prensa).
- Martínez, M.M., Y. Bilat y J.P. Isacch. 1998. Nuevos registros de *Pandion haliaetus* (Falconiformes: Pandionidae) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Neotrópica*, 44 (111-112): 64.
- Maugeri, G.F. 1999. Nuevo registro del Chinchero Grande (*Drymornis bridgesii*) para el nordeste de Buenos Aires. *Nuestras Aves*, 40: 22.
- Montaldo, N.H. y G.G. Roitman. 1999. Registro del Burlisto Castaño (*Casiornis rufa*) en la selva de Punta Lara, provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves*, 40: 19.
- Montalti, D. y R. Maragliano. 1996. Nueva localidad para *Phimosus infuscatus* (Aves: Threskiornithidae). *Neotrópica*, 42 (107-108): 124.
- Morici, A. 1998. Nuevos aportes a la avifauna bonaerense – II – *APRONA* N° 34: 9-10.
- Morici, A. y A. J. Dieguez. 1997. Nuevos aportes a la avifauna bonaerense – I – *APRONA* N° 32: 22-26.
- Moschione, F.N. 1993. El Macuquito (*Lochmias nematura*) en isla Martín García, Buenos Aires. *Nuestras Aves*, 29: 29.
- Narosky, T. y A. Di Giácomo. 1993. *Las aves de la provincia de Buenos Aires: distribución y estatus*. A.O.P., Vázquez Mazzini Ed., L.O.L.A., 127 pp.

- Narosky, T., A. Di Giacomo y M. Babarskas. 1993. Presencia invernal del Chorlito Ceniciento (*Pluvianellus socialis*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Hornero*, 13 (4): 309-310.
- Navas, J.R. 1987. Los vertebrados exóticos introducidos en la Argentina. *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat., Zool.*, 14 (2): 7-38.
- Navas, J.R., T. Narosky, N.A. Bó y J.C. Chebez. 1991. *Lista patrón de los nombres comunes de las aves argentinas*. A.O.P., 39 pp.
- Olson, D.M. & E. Dinerstein. 1994. Assesin the Conservation Potential and Degree of Threat among Ecoregions of Latin America and the Caribbean: a Proposed Landscape Ecology Approach. *LATEN Dissemination Note N° 10*; The World Bank Latin America Technical Department Environment Division.
- Povedano, H. 1999. Nidificación del Gaviotín Chico Común (*Sterna superciliaris*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves*, 39: 11-12.
- Ringuelet, R. y R. Arámburu. 1957. *Enumeración sistemática de los vertebrados de la provincia de Buenos Aires*. Ministerio de Asuntos Agrarios N° 119. La Plata.
- Rivero, E.M., B. Lartigau, P. Caridad y P. Ramírez Llorens. 1996. Registro concreto de nidificación del Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*) en la Argentina. *Nuestras Aves*, 34: 46.
- Sarandón, R. 1992. Biodiversidad: un compromiso de la humanidad. *Ambiente*, N° 74: 46-53.
- Sarandón, S.J. y R. Sarandón. 1993. Un enfoque ecológico para una agricultura sustentable. Cap. 19. Pag. 279-286. En: Going, F. y R. Goñi (Eds.). Elementos de política ambiental. H. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, La Plata.
- Solbrig, O.T. 1991. From genes to ecosystems: a research agenda for biodiversity. Report of a IUBS-SCOPE-UNESCO workshop, Cambridge, MA, USA; pag. 124.
- Solbrig, O.T., H.M. van Emden & P.G.W.J. van Oordt (Eds.). 1992. Biodiversity and Global Change. International Union of Biological Sciences. Mon. N° 8, Paris, 222 pp.
- Tubaro, P.L. y F.M. Gabelli. 1993. *Informe Final del Proyecto "Distribución actual y selección de habitat del Pecho Colorado Mediano (Sturnella defilippi)"*. Financiado por International Council for Bird Preservation y U.S. Fish and Wildlife Service.
- Yorio, P., E. Frere, P. Gandini y G. Harris. 1998. Atlas de la distribución reproductiva de aves marinas en el litoral patagónico argentino. Fundación Patagonia Natural, 221 pp.

- Zalba, S.M. y C.J. Belenguer. 1996. Nidificación del Gaviotín Sudamericano (*Sterna hirundinacea*) en Bahía San Blas, Buenos Aires. *Nuestras Aves*, 35: 33-34.
- Zapata, A.R.P., 1995/96. Las aves de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Situación ambiental de la provincia de Buenos Aires. *Rev.C.I.C.*, Buenos Aires, Año 5 N° 29, 55 pp
- Zapata, A.R.P. 1998. Aves registradas en la región de la laguna Chasicó, sudoeste de la provincia de Buenos Aires. *Natura Neotropicalis*, 29 (2): 156-161.
- Zapata, A.R.P. 2000. Primera cita de *Thraupis bonariensis schulzi* Brodkorb 1938 para la provincia de Buenos Aires (Aves: Emberizidae). *Neotrópica*, 46: 78.