

Lista actualizada de los peces del arrecife Alacranes, Yucatán, México

CARLOS GONZÁLEZ-GÁNDARA*
JESÚS ERNESTO ARIAS-GONZÁLEZ**

Resumen. Como resultado de los estudios ictiológicos realizados en el arrecife Alacranes, Yucatán, de febrero de 1997 a noviembre de 1999, se presenta una lista que incluye 230 especies, 118 géneros y 59 familias de peces. Los peces fueron identificados principalmente mediante censos visuales. Para complementar la información, se hicieron recolectas con diferentes artes de pesca y se muestrearon las capturas de los barcos que operan en el sitio de estudio. Las familias mejor representadas por su número de especies fueron: Serranidae (23), Labridae (13), Scaridae (13), Pomacentridae (13) y Gobiidae (12). La comparación de estos resultados con la información ictiológica para el sistema arrecifal Alacranes de otros autores indica que 80 especies de peces constituyen nuevos registros y de éstos ocho son nuevos para México.

Palabras clave: inventario de especies, peces de arrecifes coralinos, arrecife Alacranes, México.

Abstract. A checklist is presented, as a result of ichthyological research carried out in the Alacranes Reef in Yucatan, Mexico between February 1997 and November 1999. The list includes 230 species in 118 genera and 59 families. Fish species were principally identified visually. These were complemented with collections using different fishing methods and by sampling fish capture in ships in the area. The best represented families by number of species were: Serranidae (23); Labridae (13); Scaridae (13); Pomacentridae (13); and Gobiidae (12). Based on comparisons with previous research in the Alacranes Reef, these results represent 80 new species records for this system and eight new records for Mexico.

Key words: checklist, coral reef fishes, Alacranes Reef, Mexico.

*Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Universidad Veracruzana. Apartado postal 70. Tuxpan, Veracruz, México.

**Laboratorio de Ecología de Ecosistemas de Arrecifes Coralinos. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados IPN, Unidad Mérida, Carr. antigua a Progreso Km. 6, 97310 Mérida, Yucatán, México. e.e.: cggandara@prodigy.net.mx; earias@kin.cieamer.conacyt.mx

Introducción

El problema que enfrentan los arrecifes de coral en todo el mundo exige un conocimiento claro y preciso de las comunidades biológicas que los habitan (Grigg 1994), con el fin de definir planes de manejo acordes a las características y condiciones de cada sistema. Las comunidades de los arrecifes coralinos del sureste del Golfo de México son poco conocidas, debido a que los esfuerzos de investigación han sido mínimos, puntuales y dispersos en el tiempo, especialmente los que se refieren a las comunidades de peces, lo que genera vacíos de información y pocas posibilidades para integrar el conocimiento que explique la estructura y el funcionamiento de estas comunidades en los arrecifes coralinos.

Por sus características (lejanía a la costa, dimensiones, etc.), el Arrecife Alacranes puede ser considerado un sitio ideal para la conservación de los arrecifes coralinos y de sus comunidades asociadas. Por esta razón fue declarado Parque Marino Nacional el 5 de junio de 1994 (Diario Oficial 1994). El Plan de Manejo diseñado por Ardisson *et al.* (1996) para este sistema fue realizado en función de la información disponible en ese momento. Sin embargo, se requiere un replanteamiento que considere las características estructurales y funcionales del arrecife, así como los efectos que sobre él ocasionan actividades como la pesca y el turismo. Por tal razón, es necesario contar con un inventario completo de las especies que habitan el arrecife. Los trabajos de Hildebrand *et al.* (1964), Garduño (1988), Cabrera y Castañeda (1989) y González-Salas (1999) representan un aporte importante al conocimiento de la ictiofauna del arrecife Alacranes, pero sus listas son incompletas, considerando que potencialmente existen entre 400 y 500 especies de peces en esta área de acuerdo con Böhlke y Chaplin (1993) y Humann (1994). Este trabajo tiene como objetivo complementar y actualizar el inventario de especies de peces del arrecife Alacranes.

Materiales y métodos

El Arrecife Alacranes se localiza aproximadamente a 135 km al norte de Progreso, Yucatán (22° 21', 22° 36' N y 89° 36', 89° 49' O). Se realizaron 131 censos visuales diurnos (Fig. 1) basados en la técnica utilizada por Galzin (1987), de febrero de 1997 a noviembre de 1999, empleando el censo visual aleatorio durante 30 minutos mediante buceo libre y con equipo autónomo SCUBA. En las zonas con profundidad de 20 a 30 m, los censos visuales tuvieron una duración de 10 minutos. Para complementar la información se realizaron capturas con diferentes artes de pesca (chinchorro, red de enmalle, red de mano, anzuelo y arpón) y se muestrearon las capturas de los barcos pesqueros que operan en el arrecife Alacranes. Los ejemplares capturados se fijaron en formol al 10%. Posteriormente se identificaron de acuerdo a Hoese & Moore (1977), Robins & Ray (1986), Böhlke & Chaplin (1993) y Humann (1994). Después se pasaron a una solución de alcohol etílico al 70% y se depositaron en la colección ictiológica del Laboratorio de Ecología de Ecosistemas de Arrecifes Coralinos del




Fig. 1. Localización geográfica del arrecife Alacranes y de las zonas de muestreo. Cada punto corresponde a una estación muestreada por censo visual.

CINVESTAV-IPN, Unidad Mérida (CIEA-PE). Las especies se ordenaron siguiendo el criterio de Nelson (1994) para las categorías supragenéricas, y los géneros y las especies, alfabéticamente. La lista de especies obtenida se acumuló a las listas de peces previas, actualizándose los nombres de acuerdo al catálogo publicado por Eschmeyer (1998).

Resultados

En la presente investigación se citan 59 familias, 116 géneros y 230 especies. Las familias mejor representadas por su número de especies fueron: Serranidae (23), Scaridae (13), Pomacentridae (13), Labridae (13) y Gobiidae (12). El cuadro 1 presenta la lista actualizada de las especies de peces para el arrecife Alacranes, indicando los autores que las han registrado. Con los datos registrados en este trabajo, los peces en el arrecife Alacranes están representados por 279 especies, 141 géneros y 65 familias, incrementándose en un 29% el conocimiento de la biodiversidad ictiofaunística local. Los 80 registros nuevos para el arrecife Alacranes, incluyen ocho que son nuevos para México: *Synodus saurus* (Linnaeus 1758); *Labrisomus filamentosus* Springer 1960; *Coralliozetus bahamensis* (Stephens 1961); *Hypleurochilus bermudensis* Beebe & Ten-Van 1933; *Parablennius marmoratus* (Poey 1876); *Gobiosoma xanthiprora* Böhlke & Robins 1968; *Microgobius carri* Fowler 1945; e *Ioglossus helenae* Randall 1967 (Cuadro 1).

Cuadro 1. Lista sistemática comparativa de las especies de peces que habitan en el arrecife Alacranes

Orden	Familia	Especie	Hildebrand et al.				Este trabajo
			1964	1968	1969	1990	
RECTOLIBIFORMES	Ginglymostomatidae	<i>Ginglymostoma cirratum</i> (Bonmatier 1788) ^{crp}	*		*		*
		<i>Carcharias fulviformis</i> (Bibron 1841) ^p					*
		<i>Carcharias leucas</i> (Valenciennes 1839) ^p					*
		<i>Carcharias limbatus</i> (Valenciennes 1841) ^p					*
		<i>Carcharias jerezi</i> (Poey 1876) ^f					*
CARCHARHINIFORMES	Carcharhinidae	<i>Carcharias plumbeus</i> (Nardo 1827) ^p					*
		<i>Negaprion brevirostris</i> (Poey 1868) ^p	*				*
		<i>Narcina brasiliensis</i> (Olfers 1831) ^m					*
		<i>Rhinobatos lewini</i> (Garman 1880) ^p					*
		<i>Dasypatis americana</i> Hildebrand & Schroeder 1928 ^{crp}					*
RAJIFORMES	Narcinidae	<i>Dasypatis ispi</i> (Lesueur 1817) ^{cr}					*
		<i>Urolophus jamaicensis</i> (Cuvier 1816) ^{cr}					*
		<i>Atalapha noronhai</i> (Euphrasen 1790) ^{crp}					*
		<i>Mentis brevistris</i> (Walbaum 1792) ^p					*
		<i>Megalops atlanticus</i> Valenciennes 1847					*
		<i>Albula vulpes</i> (Linnaeus 1758) ^{crp}					*
		<i>Enchelychirus nigricans</i> (Bonmatier 1788)					*
		<i>Gymnothorax fuscus</i> Ranzani 1840 ^{cr}					*
		<i>Gymnothorax milneri</i> (Kaup 1856) ^{crp}					*
		<i>Gymnothorax moringa</i> (Cuvier 1829) ^{crp}					*
ALBULIFORMES	Albulidae	<i>Gymnothorax saxicola</i> Jordan & Davis 1891					*
		<i>Gymnothorax vicinus</i> (Castelnau 1855) ^{cr}					*
		<i>Murana melanotis</i> (Kaup 1860)					*
		<i>Albia egmontii</i> (Jordan 1884)					*
		<i>Hoplunnis tenuis</i> Ginsburg 1951					*
		<i>Anchoa hepsetronia</i> Hildebrand 1943 ^{cr}					*
		<i>Harengula clupeiola</i> (Cuvier 1829) ^{crp}					*
		<i>Harengula humeralis</i> (Cuvier 1829) ^{crp}					*
		<i>Opisthonema oglinum</i> (Lesueur 1818)					*
		<i>Jenkinia lampretarctus</i> (Coose 1851) ^{cr}					*
ANGUILLIFORMES	Muracnidae	<i>Jenkinia majus</i> Whitehead 1963 ^{cr}					*
							*
							*
							*
							*
							*
							*
							*
							*
							*
CLUPEIFORMES	Ophichthidae						*
							*
							*
							*
							*
CLUPEIFORMES	Netastomatidae						*
							*
							*
							*
							*
CLUPEIFORMES	Engraulidae						*
							*
							*
							*
							*
CLUPEIFORMES	Chupeidae						*
							*
							*
							*
							*

AULOPIFORMES	Synodontidae	<i>Synodus foetens</i> (Linnaeus 1766)	*		*
		<i>Synodus intermedius</i> (Spix y Agassiz 1829) ^c			*
		<i>Synodus saurus</i> (Linnaeus 1758) ^a	*		*
OPHIDIIFORMES	Bythiidae	<i>Synodus synodus</i> (Linnaeus 1758) ^c	*		*
BATRACHOIDIFORMES	Batrachoididae	<i>Trachinocephalus myops</i> (Forster 1801)	*		*
LOPHIIFORMES	Ogcocephalidae	<i>Ogallia capronis</i> Evermann & Kendall 1898	*		*
MUGILIFORMES	Mugilidae	<i>Opiomus parvus</i> (Goode & Bean 1880) ^f	*		*
ATHERINIFORMES	Atherinidae	<i>Ogcocephalus rostratus</i> (Mitchill 1818) ^f	*		*
		<i>Mugil curema</i> Valenciennes 1856 ^p	*		*
		<i>Atherinomorus stepet</i> (Müller & Troschel 1848) ^{c,p}	*		*
		<i>Membreus macrinus</i> (Valenciennes 1835) ^c	*		*
		<i>Platybelle argulus</i> (Laceur 1821) ^c	*		*
BELONIFORMES	Belontiidae	<i>Strongylura marinus</i> (Walbaum 1792) ^f	*		*
		<i>Strongylura notata</i> (Poey 1860) ^c	*		*
		<i>Tylasurus imperialis</i> (Rafinesque 1810)	*		*
		<i>Tylasurus crocodilus</i> (Péron & Lesueur 1821) ^c	*		*
BERYCIFORMES	Hemiramphidae	<i>Hemiramphus brasiliensis</i> (Linnaeus 1758) ^a	*		*
	Holocentridae	<i>Holocentrus adoniansis</i> (Osbeck 1765) ^{c,p}	*		*
		<i>Holocentrus rufus</i> (Walbaum 1792) ^f	*		*
		<i>Myripristis jaculus</i> Cuvier 1829 ^a	*		*
		<i>Sargocentron coruscum</i> (Poey 1860)	*		*
		<i>Sargocentron vesillarium</i> (Poey 1860) ^f	*		*
		<i>Cosmocampus albivittis</i> (Kaup 1856)	*		*
		<i>Cosmocampus brachycephalus</i> (Poey 1868)	*		*
		<i>Cosmocampus eburnus</i> (Poey 1868)	*		*
		<i>Syngnathus pelagicus</i> Linnaeus 1758	*		*
GASTEROSTEIFORMES	Syngnathidae	<i>Aulostomus maculatus</i> Valenciennes 1837 ^c	*		*
	Aulostomidae	<i>Scorpaeno bergi</i> Evermann & Marsh 1900	*		*
ESCORPAENIFORMES	Scorpaenidae	<i>Scorpaena grandicornis</i> Cuvier 1829	*		*
		<i>Scorpaena plumieri</i> Bloch 1789 ^c	*		*
		<i>Cephalopholis cruentata</i> (Lacépède 1802) ^{c,p}	*		*
		<i>Cephalopholis fulva</i> (Linnaeus 1758) ^c	*		*
		<i>Diplodus formosus</i> (Linnaeus 1766) ^c	*		*
		<i>Epiplatys adoniansis</i> (Osbeck 1765) ^{c,p}	*		*
PERCIFORMES	Serranidae		*		*

Cuadro 1. Continúa

Orden	Familia	Especie	Hildebrand et al. Carduelis				Este trabajo
			1964	1968	1969	1969	
		<i>Epimiphelus guttatus</i> (Linnaeus 1758) ^{CCP}		*		*	
		<i>Epimiphelus itajara</i> (Lichtenstein 1822) ^P				*	
		<i>Epimiphelus morio</i> (Valenciennes 1828) ^{CCP}	*		*	*	
		<i>Epimiphelus strabus</i> (Bloch 1792) ^{CCP}	*			*	
		<i>Hypoplectrus gemma</i> Goode & Bean 1882 ^O		*		*	
		<i>Hypoplectrus indigo</i> Poey 1851 ^O		*		*	
		<i>Hypoplectrus nigricans</i> (Poey 1852) ^O				*	
		<i>Hypoplectrus puella</i> (Cuvier 1828) ^{CC}		*		*	
		<i>Hypoplectrus unicolor</i> (Walbaum 1792) ^{CC}	*			*	
		<i>Mycteroperca bonaci</i> (Poey 1860) ^{CCP}		*		*	
		<i>Mycteroperca interstitialis</i> (Poey 1860) ^{CCP}				*	
		<i>Mycteroperca bigra</i> (Valenciennes 1833) ^{CCP}		*		*	
		<i>Mycteroperca venusta</i> (Linnaeus 1758) ^{CCP}		*		*	
		<i>Parasutis furcifer</i> (Valenciennes 1828) ^O				*	
		<i>Rypticus saponaceus</i> (Bloch & Schneider 1801) ^O				*	
		<i>Serranus baldwani</i> (Evermann & Marsh 1899) ^{CC}				*	
		<i>Serranus tobaccarius</i> (Cuvier 1829) ^O				*	
		<i>Serranus tigrinus</i> (Bloch 1790) ^O	*	*		*	
		<i>Serranus tortugorum</i> Longley 1935 ^O				*	
		<i>Gramma loreto</i> Poey 1868 ^O				*	
Grammatidae		<i>Opistognathus averyi</i> (Jordan & Thompson 1905) ^O				*	
Opistognathidae		<i>Opistognathus macrognathus</i> Poey 1860 ^O				*	
		<i>Opistognathus maculatus</i> Poey 1860				*	
		<i>Opistognathus whitethurstoni</i> Longley & Hildebrand 1940 ^O	*			*	
		<i>Opistognathus whitethurstoni</i> Longley & Hildebrand 1940 ^O	*			*	
Pracanthidae		<i>Heteropracanthus cruentatus</i> (Lacépède 1801) ^{CC}				*	
Apogonidae		<i>Apogon bimaculatus</i> (Poey 1867) ^O	*			*	
		<i>Apogon maculatus</i> (Poey 1860) ^O	*			*	
		<i>Astragom alatus</i> (Jordan & Gilbert 1882)			*	*	
		<i>Astragom stellatus</i> (Cope 1867) ^S	*			*	

Cuadro 1. Continúa

Orden	Familia	Especie	Hildebrand et al.					Este trabajo
			1964	1968	1969	1988	1999	
		<i>Haemulon flavolineatum</i> (Desmarest 1823) ^{cv}	*	*	*	*	*	
		<i>Haemulon macrostomum</i> Günther 1859 ^{cv}	*				*	
		<i>Haemulon melanurum</i> (Linnaeus 1758) ^{cv}					*	
		<i>Haemulon parra</i> (Desmarest 1823) ^{cv,p}	*				*	
		<i>Haemulon plumieri</i> (Lacepède 1801) ^{cv,p}	*		*		*	
		<i>Haemulon sciurus</i> (Staw 1803) ^{cv,p}	*		*		*	
		<i>Inermia vitata</i> Poey 1860 ^{cv}					*	
		<i>Archosargus rhomboidalis</i> (Linnaeus 1758) ^c					*	
		<i>Calamus bayonado</i> (Bloch & Schneider 1801) ^{cv,p}				*	*	
		<i>Calamus calamus</i> (Valenciennes 1830) ^{cv,p}					*	
		<i>Calamus fernus</i> (Valenciennes 1830) ^{cv}					*	
		<i>Calamus pennatula</i> Guichenot 1868					*	
		<i>Calamus providens</i> (Jordan & Gilbert 1884) ^c					*	
		<i>Lagodon rhomboides</i> (Linnaeus 1766)	*				*	
		<i>Paropis acuminatus</i> (Bloch & Schneider 1801) ^{cv}					*	
		<i>Paropis punctatus</i> (Bloch & Schneider 1801) ^{cv}					*	
		<i>Paropis umbrinus</i> (Jordan & Eigenmann 1889) ^{cv}					*	
		<i>Odonotomus denlex</i> (Cuvier 1830) ^{cv}					*	
		<i>Mullinichthys murina</i> (Cuvier 1829) ^{cv}		*			*	
		<i>Pseudoperca maculata</i> (Bloch 1793) ^{cv}	*	*			*	
		<i>Pemppheris schomburgkii</i> Müller & Troschel 1848 ^{cv}	*				*	
		<i>Chaetodon capistratus</i> Linnaeus 1758 ^{cv}	*	*			*	
		<i>Chaetodon ocellatus</i> Bloch 1787 ^{cv}	*	*			*	
		<i>Chaetodon sedentarius</i> Poey 1860 ^{cv}		*			*	
		<i>Chaetodon striatus</i> Linnaeus 1758 ^{cv}		*			*	
		<i>Holocentrus bermudensis</i> Goode 1876 ^{cv}		*			*	
		<i>Holocentrus ciliaris</i> (Linnaeus 1758) ^{cv}	*	*			*	
		<i>Holocentrus tricolor</i> (Bloch 1795) ^{cv}	*	*			*	
		<i>Pomacanthus arcuatus</i> (Linnaeus 1758) ^{cv}	*	*		*	*	
		<i>Pomacanthus parra</i> (Bloch 1787) ^{cv}		*		*	*	

Kyphosidae	<i>Kyphosus incisor</i> (Cuvier 1831)	•	•	•
	<i>Kyphosus sexatrius</i> (Linnaeus 1766) ^{1,10}	•	•	•
Cirrhitidae	<i>Ameiurichthys pinos</i> (Mowbray 1927) ¹⁰	•	•	•
	<i>Amidolyf saxatilis</i> (Linnaeus 1758) ^{1,10}	•	•	•
Pomacentridae	<i>Chromis cyaneus</i> (Poey 1860) ¹⁰	•	•	•
	<i>Chromis enchrysurus</i> Jordan & Gilbert 1882 ²	•	•	•
	<i>Chromis insolens</i> (Cuvier 1830) ¹⁰	•	•	•
	<i>Chromis multilineatus</i> (Guichenot 1853) ^{1,10}	•	•	•
	<i>Chromis scotti</i> Etnay 1968 ¹⁰	•	•	•
	<i>Macropodus chrysurus</i> (Cuvier 1830) ^{1,10}	•	•	•
	<i>Stegastes diabolus</i> (Jordan & Rutter 1897) ¹⁰	•	•	•
	<i>Stegastes dorsopunicans</i> (Poey 1868) ¹⁰	•	•	•
	<i>Stegastes leucostictus</i> (Müller & Troschel 1848) ^{1,10}	•	•	•
	<i>Stegastes partitus</i> (Poey 1868) ¹⁰	•	•	•
	<i>Stegastes planifrons</i> (Cuvier 1830) ^{1,10}	•	•	•
	<i>Stegastes variabilis</i> (Castelnau 1855) ¹⁰	•	•	•
	<i>Bodianus pulchellus</i> (Poey 1860) ¹⁰	•	•	•
	<i>Bodianus rufus</i> (Linnaeus 1758) ^{1,10}	•	•	•
	<i>Clipacus jamae</i> (Bloch & Schneider 1801) ¹⁰	•	•	•
	<i>Doradonotus megalops</i> Günther 1862	•	•	•
	<i>Halichoeres benitatus</i> (Bloch 1791) ^{1,10}	•	•	•
	<i>Halichoeres cyanocephalus</i> (Bloch 1791)	•	•	•
	<i>Halichoeres garnoti</i> (Valenciennes 1839) ¹⁰	•	•	•
	<i>Halichoeres maculipinna</i> (Müller & Troschel 1848) ¹⁰	•	•	•
	<i>Halichoeres pictus</i> (Poey 1860) ¹⁰	•	•	•
	<i>Halichoeres poeyi</i> (Steindachner 1867) ¹⁰	•	•	•
	<i>Halichoeres radiatus</i> (Linnaeus 1758) ^{1,10}	•	•	•
	<i>Lachnolaimus maximus</i> (Walbaum 1792) ^{1,10}	•	•	•
	<i>Thalassoma bifasciatum</i> (Bloch 1791) ^{1,10}	•	•	•
	<i>Xyrichtys martinicensis</i> (Valenciennes 1840) ¹⁰	•	•	•
	<i>Xyrichtys splendens</i> (Castelnau 1855) ¹⁰	•	•	•
	<i>Cryptotomus roseus</i> Cope 1871 ¹⁰	•	•	•
Scaridae	<i>Nicholsina isia</i> (Valenciennes 1840)	•	•	•

Cuadro 1. Continúa

Orden	Familia	Especie	Hildebrand # et. 1964	Cardinale 1988	Cabrera & Curatell 1989	Conzales-Sobal 1999	Est. nat. Inago
		<i>Scarus coelestis</i> Valenciennes 1840 ^{cs}	*	*		*	*
		<i>Scarus coeruleus</i> (Bloch 1786) ^{cs}	*	*		*	*
		<i>Scarus guacamaia</i> Cuvier 1829 ^{cs}	*			*	*
		<i>Scarus iserti</i> Bloch 1789 ^{cs}	*	*		*	*
		<i>Scarus laietnophorus</i> Desmarest 1831 ^{cs}		*		*	*
		<i>Scarus velutula</i> Bloch y Schneider 1801 ^{cs}	*	*		*	*
		<i>Sparisoma atomarium</i> (Poey 1861) ^o				*	*
		<i>Sparisoma aurofrenatum</i> (Valenciennes 1840) ^{cs}	*	*		*	*
		<i>Sparisoma chrysopterygum</i> (Bloch & Schneider 1801) ^{cs}	*	*	*	*	*
		<i>Sparisoma robustum</i> (Valenciennes 1840) ^{cs}	*		*	*	*
		<i>Sparisoma rubripinnis</i> (Valenciennes 1840) ^{cs}	*	*		*	*
		<i>Sparisoma viride</i> (Bonmatier 1788) ^{cs}	*	*		*	*
		<i>Emmeocheilus jordani</i> (Evermann & Marsh 1899)	*			*	*
		<i>Emmeocheilus jordanis</i> (Fowler 1941) ^o				*	*
Tripterygiidae		<i>Labrisomus filamentosus</i> Springer 1960 ^o					*
		<i>Labrisomus gobio</i> (Valenciennes 1836) ^{cs}					*
		<i>Labrisomus guppyi</i> (Norman 1922)	*				*
		<i>Labrisomus kalisherae</i> (Jordan 1904) ^o	*		*		*
		<i>Labrisomus nuohijimnis</i> (Quoy & Gaimard 1824) ^{cs}					*
		<i>Malacodermus aurolineatus</i> Smith 1957 ^o	*				*
		<i>Malacodermus macroptus</i> (Poey 1868) ^{cs}	*		*	*	*
		<i>Malacodermus triangulatus</i> Springer 1959 ^o	*			*	*
		<i>Malacodermus versicolor</i> (Poey 1876) ^{cs}				*	*
		<i>Paratidius fasciatus</i> (Steindachner 1876)			*		*
		<i>Paratidius maculatus</i> (Steindachner 1876)	*				*
		<i>Paratidius nigripinnis</i> (Steindachner 1867)	*				*
		<i>Sarania lepicoides</i> Böhlke & Springer 1961	*				*
		<i>Acanthemblemaria aspera</i> (Longley 1927) ^{cs}	*			*	*
Chaenopsidae		<i>Chaenopsis ocellata</i> Gill 1865 ^o					*
		<i>Coralliazettes bahamensis</i> (Siephens 1961) ^o					*

	<i>Emblemaria jordanis</i> Evermann & Marsh 1900 ^{cc}	*
	<i>Hemimblemaria similis</i> Longley & Hildebrand 1940 ^{cc}	*
	<i>Stethimobius stali</i> (Evermann & Marsh 1899)	*
	<i>Entomacrodus nigricans</i> Gill 1859	*
	<i>Hypocentrotus lemniscatus</i> Beebe & Tee-Van 1933 ^{cc}	*
	<i>Ophioblennius atlanticus</i> (Valenciennes 1836) ^{cc}	*
	<i>Parablennius smaragdus</i> (Poey 1876) ^{cc}	*
	<i>Scartella cristata</i> (Linnaeus 1758) ^{cc}	*
	<i>Bombusifer oculatus</i> (Jordan & Gilbert 1884)	*
	<i>Bathygobius curacao</i> (Metzelaar 1919) ^c	*
	<i>Bathygobius soporator</i> (Valenciennes 1837) ^c	*
	<i>Coryphopterus alicurus</i> Böhlke & Robins 1960 ^{cc}	*
	<i>Coryphopterus eidolon</i> Böhlke & Robins 1960 ^{cc}	*
	<i>Coryphopterus glaucofraenum</i> Gill 1863 ^{cc}	*
	<i>Coryphopterus personatus</i> (Jordan & Thompson 1905)	*
	<i>Coryphopterus bairdianus</i> Böhlke & Robins 1962 ^{cc}	*
	<i>Gnatholepis thompsoni</i> Jordan 1904 ^{cc}	*
	<i>Gobiomellus siepoballens</i> Gilbert & Randall 1968 ^{cc}	*
	<i>Gobiomellus stigmatiscus</i> (Poey 1860)	*
	<i>Gobiomorus gresomerti</i> (Robins 1964)	*
	<i>Gobiomorus herzi</i> Metzelaar 1922	*
	<i>Gobiomorus oceanops</i> (Jordan 1904) ^{cc}	*
	<i>Gobiomorus zanthipora</i> Böhlke & Robins 1968 ^{cc}	*
	<i>Microgobius carri</i> Fowler 1945 ^{cc}	*
	<i>Mes Langus</i> (Nichols 1914) ^{cc}	*
	<i>Psilolabis alpeis</i> Ginsburg 1953	*
	<i>Teptodus callianus</i> Jordan & Gilbert 1882 ^c	*
	<i>Teptodus helenez</i> Randall 1967 ^{cc}	*
	<i>Acanthaluteres bahianus</i> Castelnau 1855 ^{cc}	*
	<i>Acanthaluteres chirogus</i> (Bloch 1787) ^{cc}	*
	<i>Acanthaluteres caeruleus</i> Bloch & Schneider 1801 ^{cc}	*
	<i>Sphyrurus barracuda</i> (Walbaum 1792) ^{cc} p	*
	<i>Acanthaluteres</i> (Lacépède 1800) ^c	*
Blenniidae		
Gobiidae		
Microdesmidae		
Acanthuridae		
Sphyracnidae		
Scombridae		

Cuadro 1. Continúa

Orden	Familia	Especie	Hildebrand et al.					Este trabajo
			1964	1968	Cabrera & Castañeda	1969	1999	
PLEURONECTIFORMES	Bothidae	<i>Scomberomorus mearnsi</i> (Mitchill 1815)	*				*	
		<i>Scomberomorus regalis</i> (Bloch 1783) ^{c,v,p}	*					
	Tetraodontiformes	<i>Baltes ocellatus</i> (Aragoiz 1831)			*			
		<i>Baltes capricornis</i> (Günther 1789)						
		<i>Baltes vetula</i> Linnaeus 1758 ^{cv}		*			*	
		<i>Candidiamerus sufflamens</i> (Mitchill 1815) ^{cv}		*			*	
		<i>Micichthys wiger</i> (Bloch 1786) ^{cv}					*	
		<i>Abudefdu schroeffi</i> (Walbaum 1792) ^{cv}					*	
		<i>Abudefdu scriptus</i> (Osbeck 1765) ^{cv}					*	
		<i>Candilichthys macrocerus</i> (Holland 1853) ^{cv}		*			*	
Ostraciidae	<i>Candilichthys pallas</i> (Ranzani 1842) ^{cv}		*			*		
	<i>Monacanthus ciliatus</i> (Mitchill 1818) ^{cv}		*			*		
	<i>Monacanthus tocheri</i> Bean 1906 ^{cv}					*		
	<i>Strophomolepis hispidus</i> (Linnaeus 1766)	*				*		
	<i>Strophomolepis setifer</i> (Bennett 1831) ^{cv}	*				*		
	<i>Acanthostichium polygrammus</i> Poey 1876 ^{cv}					*		
	<i>Acanthostichium quadricornis</i> (Linnaeus 1758) ^{cv}					*		
	<i>Lactophrys lucasulus</i> (Linnaeus 1758) ^{cv}	*				*		
	<i>Lactophrys trigonus</i> (Linnaeus 1758) ^{cv}	*				*		
	<i>Lactophrys triquetra</i> (Linnaeus 1758) ^{cv}		*			*		
Diodontidae	<i>Camidogaster rostrata</i> (Bloch 1786) ^{cv}		*			*		
	<i>Sphaeroides nepselus</i> (Goode y Bean 1882)		*			*		
	<i>Sphaeroides spongleri</i> (Bloch 1785) ^{cv}	*			*	*		
	<i>Sphaeroides testudinens</i> (Linnaeus 1758)		*			*		
Diodontidae	<i>Diodon holocanthus</i> Linnaeus 1758 ^{cv}		*			*		
	<i>Diodon hystrix</i> Linnaeus 1758 ^{cv}		*			*		
Número total de especies			159	70	57	84	230	

c = capturadas; cv = determinadas por censo visual; y = encontradas en pesca comercial en el lugar.

Discusión

Previamente a este trabajo se consideraban 54 familias, 108 géneros y 199 especies de peces. Con la información recabada, el inventario aumentó a 65 familias, 141 géneros y 279 especies. El incremento de 29%, se explica por la diversificación de los métodos de muestreo y la cobertura de numerosos ambientes dentro del sistema. Aún cuando el aporte es importante, se requiere un mayor esfuerzo para conocer la biodiversidad del arrecife Alacranes, principalmente para las especies crípticas y las que habitan en zonas con profundidad superior a 30 m. En esta lista se omitieron *Gillelus semicinctus* (Gilbert 1890), citada por Hildebrand *et al.* (1964) y *Haemulon bonariense* (Cuvier 1830), registrada por Hildebrand *et al.* (1964) y Cabrera & Castañeda (1989) para el sistema arrecifal Alacranes. De acuerdo con Eschmeyer (1998), *G. semicinctus* se distribuye en el Pacífico y *H. bonariense* en el sur del continente americano, por lo que es dudosa su participación en la comunidad ictiológica del arrecife Alacranes.

Los trabajos realizados previamente (Hildebrand *et al.* 1964, Garduño 1988, González-Salas 1999) se han centrado en la laguna del arrecife Alacranes, o bien, en los alrededores de isla Pérez (Cabrera & Castañeda 1989). Este trabajo constituye el primer intento por cubrir la totalidad del sistema arrecifal, incluyendo observaciones entre 20 y 30 m de profundidad. Esto permitió aumentar de manera notable el registro de especies. El censo visual, como técnica de identificación, es una herramienta ampliamente utilizada en los estudios de peces de arrecifes coralinos; sin embargo, tiene limitantes para identificar algunas especies crípticas (e.g. Trypterygiidae) y de tallas pequeñas, por lo que algunas veces fue necesario confirmar la identidad de las especies mediante la captura de organismos, o con un número mayor de observaciones *in situ*. Las especies cuyos registros fueron realizados por censo visual, se observaron detalladamente en más de dos ocasiones. Si bien la presente contribución es importante, aún se requiere un mayor esfuerzo para conocer la biodiversidad ictiofaunística del arrecife Alacranes, en especial las especies crípticas.

Agradecimientos. Por el apoyo logístico, a Esperanza Pérez Díaz. A Carlos González Salas y Armín Tuz Sulub por su colaboración en la colecta de organismos. A la Secretaría de Marina-Armada de México por el apoyo para el transporte al arrecife Alacranes, especialmente a la tripulación del barco Río Tonalá. Al CONACYT-SISIERRA (P-950607) por el financiamiento del proyecto "Funcionamiento y estructura trófica de las comunidades de peces arrecifales del arrecife Alacranes".

Literatura citada

- ARDISSON, H.P.L., J.J. DURÁN-NÁJERA, L.A. AGUIRRE-BUENFIL & J. CANELA-ROJO. 1996. *Programa de manejo del Parque Marino Nacional Arrecife Alacranes*. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Mérida, Yucatán. 96 p.

- BÖHLKE, J.E. & C.C.G. CHAPLIN. 1993. *Fishes of the Bahamas and adjacent tropical waters*. University of Texas Press, Austin. 771 p.
- CABRERA, M.I. & E. CASTAÑEDA. 1989. Contribución al conocimiento de los peces de Isla Pérez. *Sec. Mar. Biol. Mar.* 5(1): 15-34.
- ESCHMEYER, W.N. 1998. *Catalog of fishes*. California Academy of Sciences, San Francisco, 2095 p.
- GALZIN, R. 1987. Structure of fish communities of French Polynesian coral reefs. I. Spatial scales. *Marine Ecology Progress Series* 41:129-136.
- GARDUÑO, A.M. 1988. *Distribución de la ictiofauna asociada a los arrecifes del Caribe mexicano*. Tesis de maestría, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Instituto Politécnico Nacional. Mérida, Yucatán.
- DIARIO OFICIAL. 1994. Decreto de Área Natural Protegida como Parque Marino Nacional. Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. CDLXXXIX (4):73-77.
- GONZÁLEZ-SALAS, C. 1999. *Distribución y abundancia de los peces arrecifales asociada al sistema lagunar del Arrecife Alacranes, Yucatán, México*. Tesis, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida.
- GRIGG, R.W. 1994. The International Coral Reef Initiative: conservation and effective management of marine resources. *Coral Reefs* 13(4):197-198.
- HILDEBRAND, H. H., H. CHÁVEZ & H. COMPTON. 1964. Aporte al conocimiento de los peces del arrecife Alacranes, Yucatán (México). *Ciencia*. 23(3): 107-134.
- HOESE, H. D. & R.H. MOORE. 1977. *Fishes of the Gulf of Mexico, Texas, Louisiana, and adjacent waters*. Texas A & M University Press, College Station. 327 p.
- HUMANN, P. 1994. *Reef fish identification. Florida Caribbean Bahamas*. New World Publications, Jacksonville, Florida. 396 p.
- NELSON, J.S. 1994. *Fishes of the world*. Wiley, New York. 600 p.
- ROBINS, C.R.G. & C. RAY. 1986. *A field guide to Atlantic Coast fishes of North America*. Houghton Mifflin, Boston, Massachusetts (Peterson Field Guides 32). 354 p.

Recibido: 25. IX. 2000

Aceptado: 10. I. 2001